

Beaucarnea recurvata

synonyma: *Beaucarnea inermis*, *Beaucarnea tuberculata*, *Dasyilirion inerme*, *Dasyilirion recurvatum*, *Nolina recurvata*, *Pincenectitia tuberculata*

čeleď: Asparagaceae

oblasti: JV Mexiko, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz

Roste v polopouštích Mexika v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 6 - 9 (i 15)m s délkou listů až 1m. Svráštělý hnědošedý kmínek této rostliny je v dolní části rozšířený na průměr až 2 - 3m a směrem vzhůru se zužuje, vzdáleně může připomínat malou sloní nohu. Malý semenáček nejprve vyrůstají z malé cibulky, který je ovšem také obnažený. Prvních 10 let nolina nabývá na tloušče, přibližně 1cm za rok. Poté začne nabývat i na výšce. Vrchol zdobí bohatý chochol dlouhých zelených listů obloukovitě spadajících k zemi, mají délku 1 - 1,8m a šířku 1,3 - 2,5cm. Kvetou teprve velmi staré rostliny rozložitým vejčitým klasovitým květenstvím o délce 0,7 - 1m na 20 - 30cm stopce s velkým počtem drobných běložlutých květů a vlastní květy mají velikost 1,5 - 3mm. Plodem je dřevnatá tobolka.

Vyžaduje světlejší místo (přímé slunce v tomto případě, oproti většině ostatních sukulentů, není potřeba). Zálivku provádíme nárazově, tzn. nechat zcela proschnout a pak vydatné zalít. V zimě zálivku omezíme na 1x za 1 - 2 týdny. Delší sucho snášejí rostliny výborně, takže když zapomeneme, nic se neděje. Několikrát do roka můžeme rostliny přihnojit, nejlépe speciálním hnojivem pro kaktusy a sukulenty. Teploty by neměly nikdy klesat pod 10 °C. Mladé rostliny je vhodné každý rok přesadit. Starší rostliny stačí přesadit jednou za tři roky. Květináč použijeme jen o trochu větší než byl předchozí. Jako substrát je vhodná směs zeminy pro vápnomilné rostliny a hrubozrnného písku v poměru asi 3:1. Seříznutím rostliny docílíte rozdvojení kmene.

Množí se pouze semeny nebo vrcholovými řízků.

<https://www.rostliny.net/>