

Sorbus prattii (Jeřáb Prattův)

synonyma: *Sorbus munda* f. *subarachnoidea*, *Sorbus munda* f. *tatsienensis*, *S.* var. *tatsienensis*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Bhútán, Sichuan, Sikkim, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu a Indii v podobě řídkého asymetricky vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 7m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené tvořené 9 - 17ti páry lístků po 0,6 - 1cm, řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm, vlastní lístky jsou vejčitékopinaté, ostře drobně pilovité, v dolní 1/3 celokrajné, ve zbytku s 5 - 10ti zuby, tmavězelené, dlouhé 1,5 - 3cm, široké 0,5 - 1cm, spodní strana modrozelená a báze zkoseně zakulacená. Květenství má délku 5 - 9cm, šířku 4,5 - 8cm, květy mají 2 - 3mm stopku, průměr 7 - 8mm, korunní lístky jsou bílé, vejčité, dlouhé 5mm, široké 4mm a kališní lístky jsou 3úhlé. Plodem je bílá kulovitá malvička průměru 6 - 9mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aestivalis*/*S. aestivalis* - Sichuan, Xizang, Yunnan; lístky zpravidla v 13 - 17ti párech, květenství holé (i drobně ochlupené)
- var. *prattii*/var. *tatsienensis*/*S. munda*/*S. munda* f. *subarachnoidea*/*S. munda* f. *tatsienensis*/*S. pogonopetala*/*S. unguiculata* - Čína, Bhútán, Indie; lístky zpravidla v 9 - 13ti párech, květenství zprvu drobně ochlupené
- var. *subarachnoidea*/*S. munda* var. *subarachnoidea* - Sichuan; spodní strana listů hustě ochlupená, hnědočervená, pavučinovitá
- var. *tatsienensis* - západní Čína; lístky menší, dlouhé 1 - 2cm, na bázi zpravidla celokrajné, spodní strana holá nebo pouze na centrální žilce ochlupená

<https://www.rostliny.net/>