

Torilis japonica (Tořice japonská)

synonyma: *Tordylium anthriscus*, *Torilis anthriscus*, *Torilis anthriscus* var. *japonica*, *Torilis praetermissa*

čeleď: Apiaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Britská Kolumbie, Česká republika, Čína, Egypt, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Japonsko, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Korea, Malá Asie (Anatolie), Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Německo, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Sibiř, SZ Afrika, Švýcarsko, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Evropě, severozápadní Africe, Kavkaze, Malé Asii, Egyptě, dále v Japonsku, Číně a Koreji. Zavléčena byla i do Severní Ameriky. Patří mezi ozimy, méně častěji jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,5)m. Povrch je štětinatý. Lodyha je přímá, větvená a jemně rýhovaná. Může být i načervenalá. Listy jsou ve spodních 2/3 řapíkaté, čepele jsou celkově dlouze vejčité, 1 - 3x zpeřené, barva šedozelená. Kvete bílými nebo narůžovělými květy v 2,5 - 4cm okolících. Květní obal tvoří 4 - 6 (i 12) listenů. Plodem je 2nažka délky 2 - 4,5mm mající špičaté ostny a jsou zakřivené.

Vyhovují ji okraje lesů, křoviny, rumišťe, atp.

<https://www.rostliny.net/>