

Haworthia marumiana

synonyma: *Haworthia arachnoidea* var. *marumiana*

čeleď: Asphodelaceae

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR. Listy vytvářejí přizemní růžici o průměru 3cm, jsou podlouhlé až kopinaté, kýlnaté, hnědě zelené až růžově fialově zelené, dlouhé 1,2 - 2cm, široké 5 - 8mm a tlusté 4mm. Květenství je vysoké 23cm, sterilní listeny jsou 3úhlé, zašpičatělé, vzpřímené, kýlnaté, dlouhé 6mm, hrozny jsou převislé, dlouhé 5cm, tvořené 10ti květy ve spirále, listeny jsou 3úhlé, špičaté, kýlnaté, dlouhé 3mm, vlastní květy mají 3mm stopku, koruna je bílá, zeleně kýlnatá, na bázi stažená a trubka má průměr 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *archeri*
- var. *batesiana*/H. *batesiana*
- var. *dimorpha*
- var. *marumiana*/H. *borealis*/H. *marmorata*/H. *tarkasia*
- var. *viridis* - Západní Kapsko; růžice průměru do 7cm; listy kopinaté, vzpřímené, kýlnaté, světle zelené, načervenalé se síťkovitou kresbou, na okraji a kýlu řídce průsvitně trnité; květenství na 20cm stonku, květy bílé, drobné

Množí se dělením.

<https://www.rostliny.net/>