

Limosella aquatica (Blatěnka vodní)

synonyma: *Danubiunculus acaulis*, *Limosella americana*, *Limosella americana* f. *submersa*, L. f. *terrestris*, L. var. *americana*

čeleď: Plantaginaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Česká republika, Grónsko, Idaho, Irsko, Island, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Labrador, Manitoba, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, Newfoundland, Nové Mexiko, Nunavut, Ontario, Oregon, Pákistán, Polsko, Quebec, S Afrika, S Mongolsko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v celé Evropě kromě střeozemí jako jednoletka, s přesahem do střední Asie a severního Mongolska a se i v severní Africe a Severní Americe. Dorůstá výšky (2 -) 3 - 8 (i 15)cm. Nevytváří lodyhu. Letní listy jsou v přízemní růžici, úzce eliptické, obkopinaté nebo úzce lžičkovité, tmavě zelené, dlouhé 0,3 - 2cm, široké 0,2 - 0,6 (i 1)cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 12cm. Jarní listy (pokud se vytvoří), jsou čárkovité. Kvete na dlouhém stonku samostatnými bílými zvonkovými kvítky s modrým až růžovým nádechem od středu o průměru (0,2 -) 0,3 - 0,5 (i 1)cm, trubkou délky 1,5mm. Plodem je 5mm kulovitá až eliptická tobolka obsahující mnoho semen délky 0,5 - 0,8mm a šířky 2 - 2,5mm. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovuje mu vlhká půda při březích potoků nebo nádrží, příkopy, atp.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>