

Erica abietina

synonyma: *Erica coccinea*, *Erica sanguinea*, *Erica spissifolia*, *Ericoides abietinum*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Kapsko

Roste v jižní Africe v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Větve bývají přeslenité, ochlupené a bohatě olistěné. Listy jsou čárkovité, špičaté, ochlupené, na okraji žláznatě zubaté a dlouhé 0,6 - 1,4cm. Květenství tvoří klasy v přeslenech, koruna je kyjovitě trubkovitá, lepivá, krátce ochlupená, červená, dlouhá 2cm a kališní lístky jsou ochlupené a vejčitékopinaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *atrorosea*

- subsp. *aurantiaca*/*E. acutiflora*/*E. exsurgens*/*E. grandiflora*/*E. grandiflora* var. *brevifolia*/*E. grandiflora* var. *exsurgens*/*E. pharetriformis*/*Ericoides exsurgens*/*Ericoides grandiflorum* - Kapsko; vzpřímený habitus; výška i šířka 1 - 1,5m; větve mírně ochlupené; listy v 6tičetných přeslenech, tuhé, jehlicovité, dlouhé 1,6 - 2cm; květenstvím je klasnatý svazeček, vlastní květy mají zelený kalich, korunu trubkovitou, lesklou až mírně lepivou, oranžovou až červenou a dlouhou 2,4 - 2,8 (i 3,5)cm

- subsp. *constantiana*/*E. conica*/*Ericoides conicum* - vzpřímený keř; výška do 50cm; listy v 4 - 6tičetných přeslenech, vzpřímené, dlouhé 0,8 - 1,2cm; květenstvím je klasnatý svazeček, květy mají zelený kalich, korunu úzce nálevkovitou až zvonkovitou, mírně lepivou, tmavě růžovočervenou a dlouhou 0,6 - 1,2cm

<https://www.rostliny.net/>