

Prunus cerasus (Višeň obecná)

synonyma: *Cerasus acida*, *Cerasus austera*, *Cerasus caproniana*, *Cerasus cerasus*, *Cerasus collina*, *Cerasus fruticosa*, *Cerasus recta*, *Cerasus vulgaris*, *Druparia cerasus*, *Prunus acida*, *Prunus aestiva*, *Prunus austera*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Indie, Írán, J Evropa, JV Evropa, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Střední Asie, Střední střeozemí, Švýcarsko, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Z Asie, Západní Virginie

Roste v jihovýchodní Evropě, Indii, Íránu a Kurdistánu. Patří mezi opadavé rostliny. Koruna je široce polokulovitá. Dorůstá výšky i šířky 5 - 8 (i 10)m v podobě keře nebo nižšího stromu. Borka má hnědě fialovou barvu a odlupuje se ve vodorovných pruzích. Mladé větve jsou hladké, lesklé, holé, v mládí světlezelené, později červenohnědé a jsou seskupené na koncích dlouhých terminálních větví. Palisty jsou čárkovité, řídce žláznatě zubaté. Listy mají vejčitý tvar se špičkou, délku 5 - 8 (i 12)cm, pilový okraj, kožovité, s lesklou tmavězelenou horní stranou a bledší spodní stranou s vystouplou žilnatinou. Kvete bílými květy s 2 - 4cm stopkou, 5ti okvětními lístky délky 1 - 1,3cm. Plodem je červená nebo černá kulatá peckovice o průměru 1,2 - 1,5 (i 2)cm na stopce. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *acida* - jižní Evropa; obvykle keř s převislými větvemi; řapíky na konci se 2mi žlázkami; plody velikosti 1cm, tmavěčervené
- var. *austera*/subsp. *eucerasus* var. *austera* - kyselka; výška 5 - 9m; větve silnější; květní stopky delší, květy velikosti až 6cm; plody tmavěčervené nebo černočervené, stopka není spojená s peckou, šťáva barví
- 'Bunyardii'/var. *bunyardii* - listy malé, tupé; květní stopky délky do 5cm
- var. *caproniana*/subsp. *eucerasus* var. *caproniana*/*P. acida*/*P. caproniana* - amarelky; výška do 9m; silnější větve; listy dlouhé do 12cm, široce eliptické, špičaté nebo krátce hroťité; stopky květů kratší; plody bleděčervené, peesté nebo žluté, šťáva nebarví; pecka obvykle kulovitá
- 'Cucullata' - listy vypouklé
- 'Duracina'
- 'Érdi Bötermö'/'M 145'/'Érdi úrodná' - mladé větve šedohnědé, ve stínu stříbřité; listy lesklé, tmavězelené; květy o průměru 3,3cm, vyrůstají po (3 -) 4 (i 5)ti, bílé; plody velikosti 1,9 - 2,1cm, lesklé, červené; pecka délky 1,1cm
- subsp. *eucerasus* - višně pravé; menší koruna; větve převislé; listy menší
- 'Fanal'/'Heimanns Konservenweichsel'/'Conserva'/'Heimann 23' - mladé větve šedohnědé, stříbřité; listy tmavězelené, lesklé; květy mají v průměru 2,4cm, vyrůstají po 3 - 4ks, jsou bílé; plody délky 1,9 - 2,4cm, lesklé, hnědočervené; pecky délky 1 - 1,1cm
- 'Favorit'/'M 24' - mladé větve bleděhnědé, částečně stříbřité; listy tmavězelené, lesklé; květy o průměru 2,8cm, vyrůstají po 3 - 4ks, bílé; plody délky 2 - 2,3cm, bleděčervené až červené; pecka délky 0,9 - 1cm
- var. *furtescens*/var. *humilis*/*P. acida* - keřovitý habitus; výška 1m; mladé větve tenké, převislé; listy odstávající, dlouhé do 5mm, eliptické nebo obvejčité; kvete po 2 - 3ks v okolících; plody s bledší nebarvicí šťávou; pecky tupé
- 'Kelleriis 14' - mladé větve středně lesklé, bleděhnědé, ve stínu stříbřité; listy středně lesklé, tmavězelené; květy mají v průměru 2,8cm, vyrůstají po 3 - 4ks, barvy bílé; plody velikosti 1,8 - 2cm, hnědočervené, lesklé; pecka délky 1cm
- 'Köröšská'/'Körösi'/'Ungarische Weichsel'/'Köröser Weichsel' - mladé větve bleděhnědé, stříbřité; listy tmavězelené, středně lesklé; květy vyrůstají po 4 - 5ks, v průměru mají 2,9cm; plody jsou

dlouhé 1,9 - 2,1cm, tmavěčervené, lesklé; pecka má délku 1 - 1,2cm

- 'Královna Hortensie'

- var. marasca - silnější; větve převisající; palisty větší; plody malé, černočervené

- 'Laciniata' - listy hluboce zastříhované

- 'Meteor Korai'/'M 14' - mladé větve bleděhnědé, mírně stříbřité; listy tmavězelené, lesklé, žilnatina vystouplá; květy mají v průměru 3,4cm, vyrůstají po 3 - 4 (i 5)ti, bílé; plody o průměru 2 - 2,1cm, lesklé, hnědočervené; pecka délky 9mm

- 'Montmorency'

- 'Morela pozdní'/'Moreillská'/'Amarelka stinná'/'Griotte du Nord'/'English Morello'/'Black Morello'/'Schattenmorelle'/'Grosse lange Lotkirsche'/'Doppelte Schattenmorelle' - mladé větve šedo hnědé, mírně stříbřité; listy jsou tmavězelené, středně lesklé; kvete o průměru 2,5cm, vyrůstají po 4ks, bílé; plody jsou dlouhé 1,8 - 2,3cm, tmavě až matněčervené až černohnědé; pecka má délku 1 - 1,2cm

- 'Morellenfeuer'/'Kelleriis 16' - mladé větve jsou bleděhnědé, u báze stříbřité; listy tmavězelené, středně lesklé; kvete o průměru 3cm po 3 - 5ti ks, bílé; plody délky 1,8 - 2,2cm, barva hnědočervená, velmi lesklá; pecka délky 1,1 - 1,2cm

- 'Persiciflora'/f. persiciflora - květy bleděružové, plnokvěté, velikosti 3cm

- 'Plena'/f. plena/f. semiplena - květy poloplňné, bílé, velikosti 3cm

- 'Polygana' - široce rozložitě vejčité koruny; výška 5m; větve ve spodní části téměř vodorovné, mírně převislé

- 'Pulverulenta' - listy bílopestře, jemně skvrnitě, nažloutlé

- 'Rhexii'/f. rhexii/P. ranunculiflora - strom výšky 4m, šířky 3m; bílé hustě plné květy velikosti 2,5 - 4cm, nejsou převislé

- 'Rybské třešně'

- 'Salicifolia'/var. salicifolia - listy dlouhé 8 - 12cm, široké 1 - 3cm, hrubě 2x pilovité

- 'Semperflorens' - široce 1/2kulatý hustě větvený keř při zemi užší; výška 3m; větve rozkladité; listy eliptické, nepravidelně pilovité; kvete až do léta po 3 - 4 (i 8)ks v řídkých květenstvích se stopkou délky 3 - 4cm; plody malé, tmavěčervené

- 'Sladkovišeň raná'

- 'Újfehértói fürtös' - mladé větve bleděhnědé, stříbřité; listy tmavězelené, středně lesklé; květy o velikosti 3,3cm, vyrůstají po 3 - 5ti ks; plody mají velikost 2,2 - 2,3cm, barvy tmavěčervené, lesklé; pecka délky 1cm

- 'Umbraculifera'/f. globosa - široce polokulovitý keř s úzkou bází; výška 2m; větve rozkladité; listy úzké

- 'Vackova'/'Vaceks Frühweichsel'/'Griotte précoce de Vacek' - mladé větve nahnědlé, stříbřité; listy tmavězelené; květy velikosti 3cm, vyrůstají po 3 - 5ks, bílé; plody průměru 1,8 - 2cm, tmavěčervené, lesklé; pecka délky 1 - 1,1cm

- 'Variegata' - listy bílo pestré, hruběji skvrnitě

- subsp. vulgaris - větve prutovité; čepel na bázi s 1 - 3mi žlázkami; květní stopky 2 - 3x delší než češule, korunní lístky nevykrojené; plody průměru 1 - 1,7cm, skelně červené, kyselé nebo sladko kyselé

- 'Záhoračka'/'Dönesova' - mladé větve bleděhnědé, stříbřité; listy tmavězelené, lesklé; květy o průměru 2,7cm, vyrůstají po 4 - 6ks; plody velikosti 1,8 - 2cm, lesklé, tmavěčervené, ve zralosti až hnědočervené; pecka délky 1,2cm

Vyhovují ji okraje lesů a cest, stráně, meze, atp.