

Prunus fruticosa (Třešeň křovitá)

synonyma: *Cerasus chamaecerasus*, *Cerasus fruticosa*, *Cerasus pumila*, *Prunus chamaecerasus*, *Prunus pumila*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Česká republika, Írán, Itálie, J Ural, Kavkaz, Kazachstán, Malá Asie (Anatolie), Montana, New York, Polsko, Rusko, S Afrika, Ukrajina

Roste v Evropě, Malé Asii, střední Asii a severní Africe v podobě široce polokulovitého opadavého hustého keře s užší bází. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 1,5 (i 2)m. Větve jsou rozkladité, beztrnné, vzpřímené, holé, mohou být převislé, v mládí leskle hnědé, pupeny jsou malé, dlouhé 2 - 4mm, vejčité, šupiny hnědé s načervenalým okrajem. Palisty jsou úzké, čárkovité a zubaté. Listy jsou střídavé, eliptické až úzce obvejčité, vroubkované, pilovité, na dlouhých větvích jsou obkopynatě eliptické, jemně vroubkovaně pilovité, bývají kožovité a dlouhé 1,5 - 6cm, široké 0,8 - 3cm, na krátkých větvích obvejčité, dlouhé jen 1,5 - 2,5cm, na konci tupé nebo zaoblené, báze klínovitá, horní strana lesklá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Kvete bílými květy na 1,5 - 3cm stopce ve svazečcích po (1 -) 2 - 5 (i 6)ti ks, průměru 1,5cm, kališní lístky jsou dlouhé 2 - 3mm, korunní lístky jsou dlouhé 5 - 7mm, tvaru podlouhlého nebo obvejčitého, jsou vykrojené, holé. Plody mají v průměru 0,7 - 1,5 (i 1,9)cm, pecky jsou nápadně 2hranné, obvykle eliptické, zašpičatělé nebo vejčité chuti příjemně nakyslé. Patří mezi ohrožené druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *pallasii* - plody velikosti 1,2 - 1,9cm
- 'Pendula'/f. *pendula*/var. *salicifolia* - deštníkovitá koruna je převislá až téměř k zemi
- 'Variegata' - deštníkovitá koruna je převislá až téměř k zemi, listy žlutě nebo béžově krogenaté

Vyhovují ji okraje lesů, slunné stráně, meze, stepy, lesostepi, atp. v nejlépe vápenité půdě s dostatkem živin. Nevadí ji ani vysychavá kamenitá místa a znečištěný vzduch.

Množí se kořenovými výmladky.

<https://www.rostliny.net/>