

Prunus mahaleb (Višeň turecká)

synonyma: *Cerasus corymbosa*, *Cerasus mahaleb*, *Druparia mahaleb*, *Padellus mahaleb*, *Padus mahaleb*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Andalusie, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Delaware, Francie, Gruzie, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Itálie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Kentucky, Korsika, Kosovo, Krym, Libanon, Maďarsko, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Moldávie, Montana, Německo, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Ťan-šan, Tennessee, Ukrajina, Utah, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze sušších lesů střední a jižní Evropy, Malé Asie, Kavkazu, Pakistánu a severozápadní Afriky. Patří mezi opadavé rostliny. Koruna je rozložitě vejčitá. Dorůstá výšky i šířky 0,8 - 10 (i 15)m často v podobě keře. Borka je v mládí je hladká, hnědá až černá, později podélně rozpukaná. Větve jsou v dolní části téměř vodorovné až mírně převislé, v mládí lepkavě ochlupené, bývají plstnaté, tenké, žlutošedé až zelenavé s tmavěhnědými lenticelami, pupeny vejčité, bleděhnědé, krátce ochlupené nebo holé. Střídavé listy mají vejčitý tvar se špičkou, bázi zaoblenou až srdčitou, pilový okraj, lesklý tmavězelený povrch, spodní stranu na žilnatině ochlupenou, délku (1,5 -) 2 - 5 (i 8)cm, šířku 1,5 - 4 (i 6,5)cm, okraj vroubkovaně pilovitý a řapíky dlouhé (0,3 -) 0,5 - 2 (i 3,5)cm s max. 2ma žlázkami. Podzimní barva je žlutá. Kvete bílými květy v (3 -) 6 - 11 (i 13)tičetném hroznu listeny jsou vejčitě eliptické, dlouhé 0,5 - 1,2cm, okraj mají žláznatě zubatý, stopky květů jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm, češule je zvonkovitá, holá, kališní lístky oválně 3úhlé, obvykle tupé, korunní lístky dlouhé (3,5 -) 4 - 7 (i 8)mm, široce obvejčité, květy široké 1,5cm. Plody jsou vejčité až kulaté, velikosti až 0,6 - 0,9 (i 1)cm a postupně podle zrání mění barvu ze zelné na žlutou, červenou a černou. Obsahují vejčitou až téměř kulovitou hladkou bledě žlutohnědou pecku. Vyrábí se z nich likér jménem Maraska. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albomarginata' - listy na okraji široce špinavě bílé
- 'Aurea' - listy pokryté žlutými stříkanými skvrnami
- 'Bommii' - převislý habitus
- subsp. *cupaniana* - endemit Itálie
- subsp. *mahaleb* (Mahabelka obecná pravá) - chlupaté až plstnaté olysávající letorosty; ochlupené mohou být i řapíky
- 'Monstrosa'/'Globosa'/f. *globosa*/var. *bommii*/var. *compacta* - nepravidelně řídce polokulovitý keř; výška 1m; větve šikmo ploše vystoupavé; pomalý růst
- 'Pendula'/var. *pendula* - široce polokulovitá koruna; výška do 8m; větve krátce obloukovitě převislé
- subsp. *simonkaii* (Mahabelka obecná Simonkaiova) - holé větve
- 'Xanthocarpa'/f. *albo*/f. *flavo*/var. *chrzocarpa* - žluté plody

Vyhovuje jí plné slunce a teplo v křovinách nebo kamenitých svazích případně okrajích lesů.

<https://www.rostliny.net/>