

Libanotis pyrenaica (Žebřice pyrenejská)

synonyma: *Athamantha libanotis*, *Balinotella libanotis*, *Crithmum pyrenaicum*, *Libanotis daucifolia*, *Libanotis humilis*, *Libanotis intermedia*, *Libanotis leiocarpa*, *Libanotis montana*, *Seseli libanotis*

čeleď: Apiaceae

oblasti: Anglie, Balkánský poloostrov, Česká republika, Itálie, J Švédsko, J Ural, Polsko, Pyreneje, Slovensko, Střední Sibiř, Španělsko, Z Evropa, Z Sibiř

Roste v západní a střední Evropě po jihovýchodní Anglii a jižní Skandinávii, dále po severní Španělsko, Itálii a Balkán a na východ po střední Sibiř. Dorůstá výšky až 1,5m. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Lodyha je větvená, rýhovaná a není dutá. Listy jsou 1 - 3x (v 2. řádu první pár křížmostojný) hluboce peřenosečné s úkrojky úzce eliptickými nebo vejčitými. Délka při bázi dosahuje až 40cm, lodyžní jsou dlouhé do 15cm. Řapík přechází v objímavou pochvu. Kvete bílými (i narůžovělými) kvítky v okolíku složeném z 20 - 40ti okolíčků z až 45ti květů. Plody mají méně vniklá žebra. Patří mezi vzácnější druhy C4.

Vyhovují ji křoviny, stráně, lomy, světlé lesy, okraje vod, atp. Ideální jsou vápencové podklady.

<https://www.rostliny.net/>