

Sapindus saponaria (Mýdelník pravý)

synonyma: *Sapindus abruptus*, *Sapindus divaricatus*, *Sapindus forsythii*, *Sapindus inaequalis*, *Sapindus indica*, *Sapindus mukorossi*, *Sapindus peruvianus*, *Sapindus peruvianus* var. *dombeyanus*, *Sapindus peruvianus* var. *meyenianus*, *Sapindus rigidus*, *S. f. genuinus*, *Sapindus stenopterus*, *Sapindus thurstonii*, *Sapindus turczaninowii*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Afrika, Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kansas, Kolorado, Louisiana, Mexiko, Mississippi, Missouri, Nové Mexiko, Oklahoma, Portoriko, Texas

Patří mezi stálezelené rostliny. Ve skupinách dorůstá výšky kolem 6m, soliterně i 15 - 25m při průměru kmene 60cm. Větve jsou hnědě ochlupené, mladé mají barvu šedohnědou a mohou být i velmi ochlupené. Ale olysávají. Střídavé listy jsou sudozpeřené i lichozpeřené, kožovitě tuhé a opadávají. Délku mají až 12 - 40cm a tvoří je 6 - 13 (i 20) úzkých kopinatých lístků délky 4 - 18cm a šířky 3 - 7cm. V žilnatině mají 10 - 15 párů. Řapíky jsou mírně křídlaté s křídly o šířce 2 - 6mm. Kvete v 15 - 20 (i 25)cm pyramidálních latách na koncích květví drobnými bílými až mírně béžovými 5tičetnými květy. Plody mají žlutou barvu a průměr 3 - 3,6cm. Obsahují jediné černé semeno o průměru 0,8 - 1cm. Vyskytují se ve skupinách 2 - 3ks. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *drummondi* - jihozápad USA, Mexiko; kvete v květnu až červnu
- var. *saponaria* - jihovýchod USA, Karibik, Havajské ostrovy, Jižní Amerika; kvete v listopadu

Vyhovují mu okraje lesů a polí nebo při úpatí hor.

<https://www.rostliny.net/>