

Danthonia decumbens (Trojzubec poléhavý)

synonyma: *Brachatera decumbens*, *Bromus decumbens*, *Danthonia decipiens*, *D. f. breviglumis*, *D. f. longiglumis*, *D. subsp. decipiens*, *D. var. breviglumis*, *D. var. longiglumis*, *Festuca decumbens*, *Melica decumbens*, *Poa decumbens*, *Sieglingia decumbens*, *Sieglingia decumbens f. gigantea*, *Sieglingia decumbens f. longiglumis*, *Sieglingia decumbens subsp. decipiens*, *Sieglingia decumbens subsp. longiglumis*, *Sieglingia decumbens subsp. mauritanica*, *Sieglingia decumbens var. breviglumis*, *Sieglingia decumbens var. eudecumbens*, *Sieglingia decumbens var. longiglumis*, *Sieglingia decumbens var. mauritanica*, *Triodia decumbens*, *Triodia decumbens var. breviglumis*, *Triodia decumbens var. longiglumis*, *Triodia glaberrima*

čeleď: Poaceae

oblasti: Andalusie, Britská Kolumbie, Česká republika, Čile, Irsko, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Makaronésie, Německo, Newfoundland, Nové Skotsko, Oregon, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Washington, Zakavkazsko

Pochází z Evropy. Patří mezi trvalky. Roste v plochých trsech. Stonek dorůstá výšky 15 - 40 (i 70)cm a může být mírně poléhavý. Listy jsou úzké, 3 žilné, sytě zelené, zašpičatělé (i ochlupené), dlouhé do 30cm, široké do 4mm a pochvy jsou řídce dlouze brvitě. Kvete v sevřené až 6cm latě složeném z 4 - 12ti střídavých stříbrozelených nebo načervenalých bezosinných lichoklásků o délce 1cm, pluchy nemají osiny a jsou krátce 3zubé. Plodem je obilka.

Vyhovují mu málo úrodné půdy, vřesoviště, okraje cest, atp. v nevápnitých půdách.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>