

Aeschynanthus acuminatus

synonyma: A. var. chinensis, Aeschynanthus bracteatus, Aeschynanthus chinensis, Trichosporum acuminatum

čeleď: Gesneriaceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, J Čína, JV Čína, JZ Čína, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Tchaj-wan, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Bhútánu, Laosu, Malajsii, Myanmaru, Nepálu, Thajsku a Vietnamu v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá délky 0,25 - 1,5m. Borka je světle šedá. Listy jsou eliptické, kopinaté až úzce obkopinaté, zašpičatělé, zpravidla celokrajné (i drobně pilovité), dlouhé 4,5 - 12cm, široké 1,4 - 5cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 9mm. Květenstvím je 1 - 4květý vrcholík na 0,8 - 3cm stopce, listeny jsou párovité, široce vejčité až prakticky kulaté, dlouhé 3 - 9mm, široké 0,3 - 1cm, vlastní květy mají 0,7 - 2,3cm stopku, kalich je červený, rozeklaný prakticky k bázi, cípy úzce eliptické až vejčité, dlouhé 2,5 - 6mm, široké 2 - 3,5mm, koruna je červená (i nazelenalá), uvnitř žláznatě ochlupená, dlouhá 1,2 - 2,2cm, trubka je široká 8mm, okraj je 2pysky, vnitřní vzpřímený, mělce 2laločný, velikosti 4,5mm, vnější ohnutý, 3laločný, velikosti 5mm. Plodem je tobolka délky 6,5 - 16cm a obsahují semena délky 0,8 - 1mm.

<https://www.rostliny.net/>