

Aeschynanthus bracteatus

synonyma: A. var. bracteatus, A. var. peelii, Aeschynanthus paxtonii, Aeschynanthus peelii, Trichosporum bracteatum

čeleď: Gesneriaceae

oblasti: Bhútán, Indie, J Čína, JV Čína, JZ Čína, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Laosu a Vietnamu v podobě keře. Kmínky jsou dlouhé 0,25 - 2m. Listy jsou vstřícné, vejčité až obvejčité, kopinaté nebo eliptické, ocasovité až zašpičatělé, kožovité, dužnaté, mohou být mělce zubaté, dlouhé 4,4 - 13cm, široké 1,5 - 6,1cm, báze je klínovitá až zakulacená nebo prakticky srdčitá a spodní strana mírně tečkovaná. Květenstvím je úžlabní 2 - 7mikvětý vrcholík na 1 - 7cm stopce, listeny jsou párovité, vejčité až kopinaté, červené, opadavé, dlouhé 1,5 - 3cm, široké 0,6 - 1,4cm, vlastní květy mají 0,6 - 2cm stopku, kalich červený, rozeklaný prakticky k bázi, laloky kopinatě eliptické až čárkovité, dlouhé 1,2 - 1,9cm, široké 2 - 6mm, koruna červená, růžová nebo růžově fialová, uvnitř žláznatě ochlupená, dlouhá 3,2 - 4,2cm, horní pysk vzpřímený, mělce 2laločný, spodní 3laločný s růžově fialovými skvrnami a oba dlouhé 6 - 8mm. Plodem je tobolka délky 7 - 21cm a obsahuje semena s 1 chlupovitým přívěskem na obou koncích.

<https://www.rostliny.net/>