

Prunus emarginata (Slivoň vykrajovaná)

synonyma: *Cerasus arida*, *Cerasus californica*, *Cerasus emarginata*, *Cerasus erecta*, *Cerasus glandulosus*, *Cerasus kelloggiana*, *Cerasus mollis*, *Cerasus obliqua*, *Cerasus obtusata*, *Cerasus padifolia*, *Cerasus parvifolia*, *Cerasus prunifolia*, *Cerasus rhamnoides*, *P. var. crenulata*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste na západě Severní Ameriky. Habitus může být keřovitý, obvykle vícekmenný, nízko zavětvený. Větve jsou šikmo vystoupavé, nepravidelně větvené, celkově vázovitá koruna. Dorůstá výšky 3 - 5m. Mladé větve jsou částečně ochlupené, později holé. Listy jsou dlouze obvejčité až obkopynaté, dlouhé 2 - 6cm, tupé až vykrojené, jemně vroubkovaně pilovité, horní strana je holá, spodní mírně ochlupená, řapíky jsou dlouhé 0,1 - 1,3cm. Kvete bílými 1cm širokými květy po 6 - 10ti ks v chocholících, stopky jsou dlouhé 0,3 - 1cm, mírně ochlupené, kališní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm, korunní lístky jsou dlouhé 3- 5mm. Plody jsou kuovité, v mládí červené, později černé, velké 0,8 - 1,2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *mollis*/*P. mollis*/*P. prunifolia* - Britská Kolumbie až Kalifornie; koruna široce rozložitě vejčitá; výška 10 - 12m; větve ve spodní části téměř vodorovně odstávají až mírně přemisají; mladé větve hustě ochlupené; listy obvejčité až podlouhlé, dlouhé do 9cm, špičaté nebo tupé, na horní straně mírně ochlupené až holé, na spodní straně měkce ochlupené; kalich ochlupený

<https://www.rostliny.net/>