

# Aeschynanthus longicaulis

synonyma: *Aeschynanthus marmoratus*, *Aeschynanthus zebrinus*, *Trichosporum griffithii*,  
*Trichosporum longicaule*, *Trichosporum marmoratum*

čeleď: Gesneriaceae

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Vietnamu, Thajsku a Malajsii. Stonek je slabý, větvený a dlouhý do 40cm. Listy jsou eliptické až kopinaté nebo obkopinaté, zašpičatělé, vroubkované až zvlňené, mohou být kožovité, voskovité, světle zeleně skvrnitě, dlouhé 6,5 - 12cm, široké 2,1 - 3,3cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé max. 5mm. Květenství tvoří 1 - 3květý svazeček, listeny jsou opadavé, vlastní květy mají 0,5 - 1,7cm stopku, kalich zelený, k bázi 5tisečný, cípy úzce kopinaté, dlouhé 1,5mm, široké 2mm, koruna je žlutě zelená, uvnitř z části ochlupená, dlouhá 2cm, okraj je mírně 2pyský, pysky prakticky stejné a dlouhé 4mm. Plodem je tobolka délky 17 - 32cm a obsahuje semena, která na straně s pupkem mají 25 chlupovitých přívěšků délky 1 - 2cm a na protější straně s 1 chlupovitým přívěskem délky 1 - 1,8cm.

<https://www.rostliny.net/>