

Aeschynanthus parasiticus

synonyma: *Aeschynanthus andamanensis*, *Aeschynanthus deleiensis*, *Aeschynanthus dolicanthus*, *Aeschynanthus grandiflorus*, *Aeschynanthus grandiflorus* var. *parasiticus*, *Aeschynanthus macranthus*, *Aeschynanthus mimetes*, *Aeschynanthus pachytrichus*, *Incarvillea parasitica*, *Trichosporum grandiflorum*, *Trichosporum macranthum*, *Trichosporum parasiticum*

čeleď: Gesneriaceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Laosu, Thajsku, Indii a Vietnamu. Kmínky jsou dlouhé 0,3 - 1m. Listy jsou vstřícné, úzce eliptické až široce vejčité nebo obvejčité, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 5,5 - 14cm, široké 1,4 - 4,6cm, báze je zúžená až zakulacená a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,1cm. Květenstvím je 2 - 11tkvětý přisedlý vrcholík, listeny vytrvalé, zelené, 3úhlé, dlouhé 0,2 - 1cm, široké 0,5 - 1,5mm, vlastní květy mají 0,7 - 1,2cm stopku, kalich zelený, mělce 5tilaločný, dlouhý 1,2 - 1,5cm, trubka v jícnu široká 4 - 6mm, laloky úzce 3úhlé, dlouhé 3 - 5mm, široké 1,2 - 2mm, koruna červeně oranžová, dlouhá 4 - 5,5cm, vně může být v horní 1/2 ochlupená, okraj je 2pyský a pysky jsou dlouhé 5 - 6mm. Plodem je tobolka délky 16 - 34cm a obsahuje semena s 2ma chlupovitými přívěsky na straně pupku a na opačné straně s 1 přívěskem.

<https://www.rostliny.net/>