

Oxalis acetosella (Šťavel kyselý)

synonyma: *Acetosella alba*, *O. f. rosea*, *O. subsp. acetosella*, *O. subsp. montana*, *O. var. caerulea*, *O. var. longicapsula*, *O. var. parviflora*, *O. var. rhodantha*, *O. var. rosea*, *O. var. subpurpurascens*, *O. var. vegeta*, *O. var. violacea*, *Oxalis alba*, *Oxalis americana*, *Oxalis americana f. rhodantha*, *Oxalis fragrans*, *Oxalis leucolepis*, *Oxalis longiflora*, *Oxalis montana*, *Oxalis montana f. rhodantha*, *Oxalis nemoralis*, *Oxalis parviflora*, *Oxalis taquetii*, *Oxalis vulgaris*, *Oxys acetosella*, *Oxys alba*, *Oxys pliniana*

čeleď: Oxalidaceae

oblasti: Afrika, Česká republika, Irsko, Itálie, Japonsko, Katalánsko, Kavkaz, Německo, Pákistán, Polsko, Severní Amerika, Sibiř, Švýcarsko

Roste v mírném pásmu Evropy a Asie jako trvalka. Dorůstá výšky (8 -) 10 - 15cm. Pod zemí má plazivé oddenky. Nevytváří lodyhu. Listy jsou zelené, tvaru 3lístku, při opakovaném dotyku reagují svěšením, pochyb je ale velice pomalý, vlastní lístky jsou dlouhé 1,2 - 3,5cm, široké 1,5 - 4,5cm a řapík má délku 3,5 - 17cm. Kvete samostatnými bílými květy s fialovým žilkováním, žlutým středem a 5ti korunními lístky na lodyze délky 15 - 20cm, kališní lístky jsou volné, úzce kopinaté a korunní lístky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Plodem je vejčitá tobolek obsahující několik semen. Je slabě jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *griffithii*
- var. *kantoensis*
- var. *rubriflora*

- f. *ionantha*
- var. *longicapsula*
- 'Rubra' - květy načervenalé

Nemá rád zásaditou půdu. Vyhovují mu listnaté nebo i smíšené lesy bohaté na živiny. Dále potřebuje stín a vlho. Je mrazuvzdorný.

<https://www.rostliny.net/>