

Ficus pumila (Fíkovník šplhavý)

synonyma: *Ficus hanceana*, *Ficus longipedicellata*, *F. var. lutchuensis*, *F. var. pumila*, *Ficus repens*, *Ficus repens var. lutchuensis*, *Ficus scandens*, *Ficus stipulata*, *Ficus vestita*, *Plagiostigma pumila*, *Urostigma scandens*, *Varinga repens*

čeleď: Moraceae

oblasti: Alabama, Ásám, Bangladéš, Benin, Dominikánská Republika, Ekvádor, Florida, Fujian, Galapágy, Georgia, Havajské ostrovy, J Čína, J Japonsko, Jáva, Kamerun, Korea, Kuba, Laos, Louisiana, Makaronésie, Návětrné ostrovy, Nepál, Nová Kaledonie, Nový Jižní Wales, Pákistán, Portoriko, Queensland, S Nový Zéland, Srí Lanka, Tchaj-wan, Texas, Thajsko, Venezuela, Vietnam, Závětrné ostrovy, Zhejiang

Roste v Japonsku, Vietnamu, Koreji, Tchaj-wanu, Laosu, Myanmaru a Číně v podobě stálezelené liány a jinde byl zavlečen. Palisty jsou kopinaté a ochlupené. Listy jsou podlouhlé až vejčité či obvejčité, špičaté až zašpičaté, dlouhé (0,5 -) 2 - 4 (i 12)cm, široké 2,5 - 4,5 (i 6)cm, báze srdčitá, spodní strana kolem žilek ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 2,5cm. Plody jsou samostatné, hruškovité až téměř kulovité, podlouhlé nebo válcovité, zelené, bíle skvrnitě, později růžově fialové, hustě ochlupené, dlouhé 4 - 8cm, široké 3 - 5cm, bazální listeny dlouhé 5 - 7mm a stopky jsou dlouhé do 1cm. Plody jsou hruškovité, růžově fialově černé a dlouhé 3,5 - 7cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *awkeotsang*/*F. awkeotseang*/*F. nagayamai* - Fujian, Zhejiang, Tchaj-wan; listy dlouze vejčité, dlouhé 7 - 12cm, široké 3 - 5cm, na spodní straně hustě rezavě ochlupené; plody podlouhlé, ochlupené, dlouhé 6 - 8cm, široké 3 - 4cm, stopky dlouhé 1cm
- 'Lis' - světle zelený list s tmavším okrajem
- 'Minima' - list délky 1cm
- var. *pumila*/*F. hanceana*/*F. stipula* - listy na sterilních větvích vejčité srdčité, tenké kožovité, zašpičaté, velké 2,5cm, báze mírně asymetrická, na fertlních větvích vejčité eliptické, dlouhé 5 - 10cm, široké 2 - 4cm, kožovité, na spodní straně žlutohnědě ochlupené, na horní holé a řapíky dlouhé 0,5 - 1cm; plody hruškovité až téměř kulovité, dlouhé 4 - 8cm, široké 3 - 5cm a stopky krátké a tlusté
- 'Quercifolia' - listy zpeřeně laločnaté, bíle panašované
- 'Radicans' - větší listy a zvlněné okraje
- 'Rikki'/'Rikke' - krémové okraje listů
- 'Sunny' - rozkladitý habitus; listy okrouhlé až oválné, zvlněné, okraj nerovnoměrně béžově panašovaný
- 'Variegata' - listy bílé až béžově mramorované
- 'White Sunny' - širší lem než Sunny

Pěstuje se ve vlhkém substrátu, třeba na mechové holi.

<https://www.rostliny.net/>