

Typha latifolia (Orobinec široolistý)

synonyma: Massula latifolia, Typha ambigua, Typha angustifolia var. inaequalis, Typha angustifolia var. media, Typha angustifolia var. sonderi, Typha crassa, Typha elatior, Typha elongata, Typha engelmannii, Typha intermedia, T. f. divisa, T. var. ambigua, T. var. angustifolia, T. var. elata, T. var. elatior, T. var. elongata, T. var. gracilis, T. var. obconica, T. var. remotiuscula, T. var. typica, Typha major, Typha media, Typha palustris, Typha pendula, Typha remotiuscula, Typha spathulifolia

čeleď: Typhaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jugoslávie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Makedonie, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Čan-šan, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Patří mezi trvalky a vodní rostliny. Dorůstá výšky 0,9 - 2 (i 3)m. Dlouhé modrozelené listy mají šířku (0,8 -) 1 - 2cm. Kvete odděleně samčím a samičím květenstvím v palicích. Samčí jsou umístěny výše a přímo navazují na spodní samičí hnědě doutníkové, obě jsou zhruba stejně dlouhé, chlupy jsou v samičích květech. Plodem je nažka s chmýrem a semena jsou dlouhá 0,9 - 1,6mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegata' - výška 1,8m, pruhovaný list

Vyhovuje mu voda o hloubce 50 - 20cm v rákosinách a stojatých vodách. Je náročný na živiny.

<https://www.rostliny.net/>