

Typha laxmannii (Orobinec sítinovitý)

synonyma: *Typha angustissima*, *Typha balansae*, *Typha bungeana*, *Typha caucasica*, *Typha elliptica*, *Typha juncea*, *Typha juncifolia*, *T. var. bungei*, *T. var. mongolica*, *T. var. planifolia*, *T. var. turczaninovii*, *Typha media*, *Typha minima*, *Typha minima subsp. laxmannii*, *Typha minima var. nana*, *Typha minor*, *Typha minuta*, *Typha nana*, *Typha poitiaei*, *Typha stenophylla*, *Typha veresczaginii*, *Typha zerovii*

čeleď: Typhaceae

oblasti: Česká republika, Írán, Itálie, JV Evropa, Polsko

Pochází z jihovýchodní Evropy. Dorůstá výšky (0,7 -) 0,8 - 1,2 (i 1,3)m. Samotné listy jsou dlouhé 50cm, široké 2 - 4 (i 7)mm a vyrůstají ve 2 řadách. Samčí květenství je větší než samičí, samičí květy bez listenů, samčí palice je 1,5 - 4x delší samičí, dlouhá 3,5 - 9cm, široká 2cm, samičí palice je dlouhá 7,5 - 15cm a široká 6mm. Patří mezi vzácné druhy C1.

Vyhovuje mu voda o hloubce 40 - 10cm.

<https://www.rostliny.net/>