

# Proboscidea louisianica (Ďáblův spár louisianský)

čeleď: Martyniaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Austrálie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Střední Amerika, SV Mexiko, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wyoming, Západní Virginie

Roste na jihu USA a severovýchodu Mexika. Patří mezi jednoletky. Dokáže lapat hmyz, ale o pravou masožravku se nejedná. Nedokáže vytvářet trávicí enzymy. Vydává nepříjemné aroma. Plodem je dřevnatá pichlavá tobolka/zahnutý lusk, která se dokáže zachytnout na kůži - odtud jméno rostliny. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *louisianica* - jih USA; světlerůžové květy
- subsp. *fragrans* - Texas a severovýchodní Mexiko; fialové až červenofialové květy

<https://www.rostliny.net/>