

Lysimachia remyi

synonyma: *Lysimachia angusta*, *Lysimachia arta*, *Lysimachia attenuata*, *Lysimachia caliginis*, *Lysimachia ciliolata*, *Lysimachia elliptica*, *Lysimachia fauriei*, *Lysimachia furcata*, *Lysimachia kalaupapaensis*, *Lysimachia kipahuluensis*, *Lysimachia kipahuluensis* subsp. *caliginis*, *Lysimachia kukuiensis*, *Lysimachia lata*, *Lysimachia molokaiensis*, *Lysimachia mucronata*, *Lysimachia munroi*, *Lysimachia occidentalis*, *Lysimachia pedicellata*, *Lysimachia pentophylla*, *Lysimachia pilosula*, *L.* subsp. *caliginis*, *L.* subsp. *kipahuluensis*, *L.* subsp. *subherbacea*, *Lysimachia rockii*, *Lysimachia scansoria*, *Lysimachia stene*, *Lysimachia subherbacea*, *Lysimachia waikoluensis*

čeleď: Primulaceae

oblasti: Havajské ostrovy

Roste na Havajských ostrovech v podobě rozlézavého až vzpřímeného keře. Kmínky jsou dlouhé až 5m, červené nebo zelené a hustě hnědočerveně plstnaté. Listy jsou střídavé nebo v přeslenech, čárkovité, obkopynaté, vejčité nebo eliptické, kožovité, občas zvlněné a vrásčité, občas podvinuté, špičaté, bledězelené až tmavězelené, dlouhé 1,5 - 9,5cm, široké 0,1 - 3,3cm, báze špičatá až ztenčená, spodní strana bledší, ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,1 - 1,2cm. Květy samostatnými květy, jsou 5 - 8mičetné, zvonkovité (i baňkovité), mají vzpřímené 0,3 - 7cm dlouhé stopky, kališní laloky zelené, na bázi červené, čárkovité, kopinaté nebo vejčité, mohou být plstnaté, dlouhé 0,25 - 1cm, široké 1 - 4,5mm, korunní laloky červené, obvejčité, dlouhé 0,5 - 1,7cm a široké 0,5 - 1,5cm. Plodem je kulovitá tobolka délky 0,4 - 1cm obsahující tmavěhnědá semena délky 1,3 - 2,9mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *caliginis*/L. *kukuiensis*/L. *pentophylla* - Maui; kmínky dlouhé až 2,5m, bleděhnědé, zpravidla hnědočerveně plstnaté; listy přeslenité (po 5ks), občas střídavé, kopinaté až vejčité, kožovité, zvlněné, vrásčité, podvinuté, špičaté, tmavězelené, dlouhé 1,8 - 7cm, široké 0,4 - 2,3cm, báze špičatá, řapíky dlouhé 1 - 5mm; květy úžlabní, 5 - 7mičetné, zvonkovité, stopky vzpřímené, zelené, pod kalichem zpravidla červené, ochlupené, dlouhé 0,8 - 4cm, kališní laloky zelené, červeně žilkované, při bázi zpravidla tmavěčervené, mohou být plstnaté, kopinaté až vejčité, dlouhé 4 - 8mm, široké 2 - 4,5mm, korunní laloky tmavěčervené, obvejčité, dlouhé 0,7 - 1,4cm, široké 0,5 - 1,25cm; tobolky kulovité až široce vejčité, dlouhé 5 - 7mm, semena tmavěhnědá, dlouhá 1,3 - 2,4mm
- subsp. *kipahuluensis*/L. *angusta*/L. *arta*/L. *furcata*/L. *kipahuluensis*/L. *kipahuluensis* - Maui; kmínky dlouhé 1m, zpravidla od báze větvené, bleděhnědé až červené, mohou být ochlupené; listy střídavé, obkopynaté až vejčité, kožovité, špičaté, bledězelené, dlouhé 1,5 - 6cm, široké 0,1 - 1,4cm, báze špičatá, spodní strana světlejší, řapíky dlouhé 1 - 4mm; květy úžlabní, 5 - 8mičetné, zvonkovité (i baňkovité), stopky vzpřímené, zelené, pod kalichem zpravidla červené, ochlupené, dlouhé 0,5 - 3,1cm, kališní laloky zelené, při bázi zpravidla tmavěčervené, mohou být plstnaté, čárkovité až vejčité, dlouhé 0,3 - 1cm, široké 1 - 5mm, korunní laloky červené, červeně žilkované, obvejčité, dlouhé 0,6 - 1,3cm, široké 0,5 - 1cm; tobolky kulovité, dlouhé 5 - 7mm, semena tmavěhnědá, dlouhá 0,9 - 2,1mm
- subsp. *remyi*/L. *ciliolata*/L. *elliptica*/L. *hillebrandii* var. *angustifolia*/L. *lata*/L. *lydgatei*/L. *occidentalis*/L. *pedicellata*/L. *pilosula*/L. *scansoria*/L. *stene*/L. *angustifolia*/L. *lydgatei* - Maui; kmínky dlouhé do 1,5m, zpravidla od báze větvené, bleděhnědé až červené, mohou být ochlupené; listy střídavé, čárkovité, kopinaté, obkopynaté, vejčité nebo eliptické (i zakulacené), kožovité, špičaté, tmavězelené, dlouhé 1,5 - 9cm, široké 0,1 - 1,3cm, báze špičatá, spodní strana světlejší, řapíky dlouhé 0,1 - 1,2cm; květy úžlabní, 5 - 8mičetné, zvonkovité (i kolovité), stopky vzpřímené, plstnaté, dlouhé 0,3 - 6,5cm, kališní laloky zelené, při bázi zpravidla tmavěčervené, mohou být plstnaté, kopinaté, dlouhé 2,5 - 9mm, široké 1 - 3,5mm, korunní laloky červené, obvejčité, dlouhé 0,5 - 1,3cm, široké 4 - 9mm; tobolky kulovité, dlouhé 0,5 - 1cm, semena tmavěhnědá, dlouhá 1,3 - 2,9mm
- subsp. *subherbacea*/L. *attenuata*/L. *fauriei*/L. *hillebrandii* var. *subherbacea*/L. *kalaupapaensis*/L. *molokaiensis*/L. *mucronata*/L. *munroi*/L. *rockii*/L. *rufa*/L. *subherbacea*/L. *waikoluensis*/L.

subherbacea - Molokai; kmínky větvené až téměř popínavé, hnědé až červené, dlouhé do 5m, v mládí plstnaté; listy střídavé (i téměř 3četně přeslenité), čárkovité, kopinaté, obkopinaté nebo obvejčité, kožovité, občas mírně zvlněné, sivozelené, mírně vrásčité, dlouhé 2 - 9,5cm, široké 0,3 - 2cm, báze špičatá, spodní strana světlejší, řídce červeně proužkovaná, řapíky dlouhé 1 - 7mm; květy úžlabní, 4 - 7mičetné, zvonkovité, vzpřímené, mají 1,1 - 7cm stopku, při kalichu zpravidla červenou, může být plstnatá, kališní laloky zelené, na bázi zpravidla červené, mohou být ochlupené, kopinaté až úzce vejčité, dlouhé 0,3 - 1cm, široké 2 - 4mm, korunní laloky růžové až tmavěčervené, na vrcholku světlejší, obvejčité, dlouhé 0,6 - 1,7cm, široké 0,5 - 1,5cm; tobolek kuklovité, dlouhé 5 - 9mm, semena tmavěhnědá, dlouhá 1 - 2,1mm

<https://www.rostliny.net/>