

Lysimachia vulgaris (Vrbina obecná)

synonyma: *Lysimachia elata*, *Lysimachia glauca*, *Lysimachia guestphalica*, *Lysimachia lutea*, *Lysimachia paludosa*, *Lysimachia paniculata*, *Lysimachia tomentosa*, *Lysimachia westphalica*, *Lysimachusa vulgaris*

čeleď: Primulaceae

oblasti: Altaj, Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Illinois, Indiana, Irák, Írán, Irsko, Itálie, Japonsko, Kaspické moře, Kašmír, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Korea, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, SZ Afrika, SZ Asie, Švýcarsko, Ťan-šan, Turecko, V Sibiř, Vermont, Washington, Wisconsin, Z Evropa, Z Sibiř, Západní Virginie

Roste v severní a západní Evropě, severozápadní Africe a dále po Japonsko a Koreu jako trvalka. Dorůstá výšky (0,4 -) 0,6 - 1,3 (i 1,5)m. Pod zemí vytváří plazivé oddenky zpravidla s růžovými výběžky. Stonek je vzpřímený a větvený. Listy jsou ve spodní části vstřícné nebo v 3 (i 4)četných přeslenech, vejčitě kopinaté až obkopinaté, zašpičatělé, tečkované, dlouhé 5 - 5,8 (i 12)cm, široké (1,2 -) 1,5 - 4cm, spodní strana je světlejší a řapíky jsou dlouhé max. 4mm. Květenstvím je vrcholová kuželovitá lata, listeny jsou vstřícné, úzce kopinaté až vejčitě kopinaté, dlouhé 5 - 6mm, vlastní květy jsou žluté s červenooranžovým okrajem, průměrem 0,8 - 1,5cm, na až 8mm stopce, kalich je dlouhý 4mm, laloky vejčitě kopinaté, dlouhé 3,8mm, koruna je 5tilaločná, dlouhá 1cm, široká 1,8cm, laloky úzce vejčité, dlouhé 7 - 9mm a široké 4,5 - 5,5mm. Plodem je tobolka velikosti 4 - 5mm a obsahuje 3úhlá hnědě bílá semena. Využívá se v léčitelství.

Potřebuje vlhká místa, okraje vod atp.

<https://www.rostliny.net/>