

Couratari macrosperma

synonyma: *Couratari impressa*, *Couratari krukovii*, *Couratari mamoreensis*, *Couratari stellulata*

čeleď: Lecythidaceae

oblasti: Amazonas, Bolívie, Peru, V Brazílie

Pochází ze střední a jihozápadní Amazonie a pobřežních lesů východní Brazílie. Roste v podobě stromu o výšce až 50m. Mladé větve jsou mírně ochlupené a olysávají. Listy jsou mírně kožovité, téměř lysé, pouze řídce hvězdovitě ochlupené, na spodní straně je centrální žebro hvězdovitě ochlupené a vyniklé, postraních žilek je 21 - 27 párů. Čepel má délku 8,5 - 17,5cm, šířku 2,5 - 7,5cm, má zašpičatělý konec, klínovitou bázi, okraj celokrajný a mírně zvlněný. Řapíky mají délku 5 - 9mm, jsou výrazně křídlaté a navíc i krátce plstnaté či olysávající. Kvete v 10 - 30cm hroznech. Plody jsou válcovité, dlouhé 12 - 15cm, široké 7cm, jsou dřevnaté a tvrdé. Obsahují dlouze kopinatá semena délky 8 - 10cm a šířky 3cm.

<https://www.rostliny.net/>