

## Lecythis chartacea

synonyma: *Cercophora anomala*, *Chytroma chartacea*, *Chytroma cistella*, *Chytroma cupularis*, *Chytroma laevicula*, *Chytroma langsdorffii*, *Chytroma marawynensis*, *Chytroma monosperma*, *Chytroma pilacarpa*, *Chytroma rorida*, *Chytroma spruceana*, *Chytroma urceolata*, *Eschweilera brancoensis*, *Eschweilera chartacea*, *Eschweilera marawynensis*, *Eschweilera rigida*, *Eschweilera rorida*, *Eschweilera spruceana*, L. var. *calyce*, *Lecythis cupularis*, *Lecythis laevicula*, *Lecythis langsdorffii*, *Lecythis marawynensis*, *Lecythis monosperma*, *Lecythis rigida*, *Lecythis rorida*, *Lecythis spruceana*

čeleď: Lecythidaceae

oblasti: Amazonas, Francouzská Guyana, Guyana

Roste v Guayaně, Francouzské Guayaně a Amazonii v podobě stromu. Dorůstá výšky až 35m. Mladé větve jsou nevýrazně ochlupené. Borka je hnědá, svisle zbrázděná a odlupuje se. Listy mají úzce až široce eliptický tvar, spodní žebro krátce ochlupené až kožovité, navazující na 9 - 16 párů žilek. Konec je zašpičatělý, báze tupá až zaoblená, okraj mírně vroubkovaný až celokrajný, celková délky 6,5 - 12cm a šířka 2 - 9cm. Řapíky mají délku 0,6 - 1,5cm a jsou krátce ochlupené. Kvete v hroznu s 2,5 - 9cm vršenem s až 20ti květy na 3,5 - 4,5cm stopkách. V průměru mají 2,5cm a tvoří jej 6 okvětních lístků délky 1,1 - 1,6cm a šířky 0,7 - 1cm. Semeníky jsou 4 - 5tipouzde a obsahují 2 - 11 vajíček. Plody mají obkruželovitý tvar délky 4 - 5cm, průměru 4cm s 5mm slupkou a světlehnědým povrchem. Semena mají červenohnědou barvu, eliptický tvar, délku 2,3 - 2,6cm a šířku 0,8 - 2cm.

<https://www.rostliny.net/>