

## Cornus canadensis (Svída kanadská)

synonyma: *Arctocrania canadensis*, *Chamaepericlymenum canadense*, *Chamaepericlymenum canadense* f. *purpurascens*, *Cornella canadensis*, *C. f. albomacula*, *C. f. alpestris*, *C. f. aphylla*, *C. f. bifoliata*, *C. f. connatifolia*, *C. f. dutillyi*, *C. f. elongata*, *C. f. florulenta*, *C. f. foliolosa*, *C. f. infraverticillata*, *C. f. medeoloides*, *C. f. ornata*, *C. f. purpurascens*, *C. f. ramosa*, *C. f. rosea*, *C. f. secunda*, *C. f. semivirescens*, *C. f. virescens*, *C. f. viridis*, *C. subsp. pristina*, *C. var. alpestris*, *C. var. dutillyi*, *Cornus cyananthus*, *Cornus fauriei*, *Cornus herbacea* var. *canadensis*, *Cornus suffruticosa*, *Cynoxylon canadense*, *Eukrania canadensis*, *Eukrania cyananthus*

čeleď: Cornaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Čína, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Japonsko, Jižní Dakota, Kolorado, Korea, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Rusko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Severní Americe, Japonsku, Koreji, Číně a Rusku jako bylina v polštářových porostech. Dorůstá výšky (7 -) 10 - 20 (i 30)cm. Stonky vyrůstají z podzemních oddenků. Listy vyrůstají v 4 (i 6)tičetných přeslenech, jsou eliptické, vejčité, obvejčité, kopinaté nebo kosníkovité, špičaté, celokrajné, na podzim červené až hnědočervené, dlouhé 2 - 6,5cm, báze klínovitá a žilnatina tvoří 2 - 3 páry žilek. Květenství je 15 - 30tičetné, široké 1 - 1,5cm, opatřené 4mi bílými listeny délky 0,8 - 1,2cm, šířky 0,5 - 1,1cm, celkovým průměrem do 8cm, květy mají 1 - 1,5mm stopku, kališní lístky 3úhlé, dlouhé 0,4mm, korunní lístky bílé, nažloutlé nebo narůžovofialovělé, vejčité kopinaté a dlouhé 1,5 - 2mm. Plodem jsou oranžové až červené peckovice průměru 5 - 8mm a obsahují vejčité pecky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. *purpurascens*/f. *rosea*/*Chamaepericlymenum canadense* f. *purpurascens* - Kanada, Newfoundland, Maine, Aljaška, Japonsko; listeny zákrovu narůžovofialovělé

Vyhovuje ji vlhká až mokrá kyselá půda.

<https://www.rostliny.net/>