

Cornus capitata (Dřín hlavatý)

synonyma: *Benthamia capitata*, *Benthamia fragifera*, *Benthamida capitata*, *Benthamidia capitata*, *Benthamidia capitata* f. *grandis*, *Benthamidia capitata* var. *khasiana*, *C. subsp. emeiensis*, *C. var. khasiana*, *Cynoxylon capitatum*, *Cynoxylon glabriusculum*, *Cynoxylon yunnanense*, *Dendrobenthamia capitata*, *Dendrobenthamia capitata* var. *emeiensis*, *Dendrobenthamia emeiensis*

čeleď: Cornaceae

oblasti: Bhútán, Guizhou, Himálaj, Hubei, Indie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Himálaji, Číně, Bhútánu, Indii, Myanmaru a Nepálu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky (10 -) 12 - 20m, ale růst je pomalý. Borka je šedohnědá až šedočerná. Větve jsou v mládí ochlupené, později šedohnědé a široce obloukovité. Listy jsou vstřícné, kožovité, vejčité až kopinaté nebo eliptické, špičaté, tmavězelené až šedozelené, mohou být lesklé, dlouhé (3,5 -) 4 - 7,5 (i 12)cm, široké (1,3 -) 1,5 - 3 (i 5)cm, báze klínovitá, spodní strana bělavá nebo namodralá a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,1cm. Květenstvím je malá 50 - 100četná hlávka se 4 - 6ti bílými až žlutými obvejčitými, obkopinatými až prakticky kulatými listeny délky 3,5 - 6,2cm, šířky 2,3 - 5cm, vlastní květy jsou drobné, kalich trubkovitý se 4mi malými tupými zuby, vně ochlupený, korunní lístky podlouhlé hrotité a dlouhé (2 -) 3 - 4mm. Plody jsou červené až červenooranžové, ochlupené, tlusté 1,5 - 4cm, pecky eliptické, dlouhé 0,8 - 1cm a široké 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *angustata*/*Cornus angustata* - Čína; stálezelený strom nebo keř; výška 4 - 12m; borka šedá až šedohnědá; větve v mládí šedozelené, ochlupené (i plstnaté), později šedohnědé; listy z obou stran šedozelené, eliptické, mírně obvejčité až kopinaté, ocasovité, kožovité, dlouhé 7 - 12cm, široké 2 - 5cm, spodní strana ochlupená, báze klínovitá; květenství 55 - 90tičetné, průměru 0,8 - 1,2cm, listeny nažloutlé až bílé, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 0,9 - 2,2cm, korunní lístky vejčité, dlouhé 2,8mm; plodenství červené, kulovité, dlouhé 1,5 - 2,5cm, bíle ochlupené

- var. *angustata*/subsp. *angustata*/*C. kousa* var. *angustata*/*Benthamidia japonica* var. *angustata*/*Cynoxylon ellipticum*/*Dendrobenthamia angustata*/*Dendrobenthamia angustata* var. *wuyishanensis*/*Dendrobenthamia hupehensis*/*Dendrobenthamia wuyishanica* - mladé větve, spodní strana listů a listeny bíle přitiskle ochlupené

- 'Elsbry'/'Empress of China' - vodorovný habitus; v 10 - 12ti letech výška do 4m; listy tmavězelené; listeny bohaté, bílé

- 'First Choice' - výška 5m, šířka 3m; listy v zimě zelené

- var. *mollis*/var. *hypoleuca*/var. *mollis*/*Benthamidia capitata* var. *mollis*/*Dendrobenthamia angustata* var. *mollis* - Sichuan, Yunnan, Hubei; mladé větve, spodní strana listů a listeny plstnaté

- 'Ticrn'/'Prodigy' - výraznější zimní barva listů; bohaté květy

- subsp. *emeiensis*/var. *emeiensis* - Sichuan; listy v mládí lesklé, oranžové nebo naoranžovělé; mrazuvzdornější

- 'Mountain Moon' - prakticky identická

- 'Ragdoll' - listy tmavě sivozelené s asymetrickým žlutozlatým okrajem

- 'Summer Passion' - listy v mládí narůžovofialovělé až hnědočervené