

Iris pumila (Kosatec nízký)

synonyma: *Iris aequiloba*, *Iris angustifolia*, *Iris biflora*, *Iris clusiana*, *Iris clusiana* var. *transsilvanica*, *Iris coerulea*, *Iris gracilis*, *Iris longiflora*, *Iris napocae*, *Iris napocae* var. *macrocarpa*, *Iris pluriscapis*, *Iris pseudopulcherrima*, *Iris pulcherrima*, *I. f. acuta*, *I. f. albiflora*, *I. f. atrovioleacea*, *I. f. romanica*, *I. subsp. aequiloba*, *I. subsp. sintenisiiformis*, *I. subsp. stenoloba*, *I. subsp. taurica*, *I. subsp. transsilvanica*, *I. subsp. tristis*, *I. var. dobrogensis*, *I. var. heliotropii*, *I. var. latispatha*, *I. var. lutea*, *I. var. macrocarpa*, *I. var. ochroleuca*, *I. var. rozaliae*, *I. var. scapifera*, *I. var. tristis*, *Iris purpurascens*, *Iris rozaliae*, *Iris sarajevoensis*, *Iris stenoloba*, *Iris taurica*, *Iris transsilvanica*, *Iris tristis*, *Iris violacea*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Balkánský poloostrov, Česká republika, Illinois, J Rusko, J Sibiř, Kavkaz, Kazachstán, Krym, Maine, Michigan, Missouri, Německo, Ontario, Rakousko, Turecko, Ukrajina, Wisconsin

Roste v Rakousku, Turecku, Balkánu, Ukrajině, jižní Sibiři, Kazachstánu, a Kavkaze. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)cm. Pod zemí vytváří silný oddenek bez výběžků. Lodyha bývá dlouhá do 4cm. Kvete zpravidla po 1ks, korunní lístky modře fialové, červeně fialové nebo světle žluté až bělavé se žlutým nebo modrým kartáčkem, vnější zpětně zahnuté a trubka má délku 2,5 - 8cm. Semena nemají aril. Patří mezi vzácné druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Captured Spirit'
- 'Little Vanessa' - starorůžové květy
- 'Stitch Witch' - fialové květy s bílým středem

Vyhovují mu skalní stepi, kamenité nebo písčité pahorky na plném slunci se zásaditým pH. Fotografie převzata z <http://www.vkolacek.cz/> .

<https://www.rostliny.net/>