

Moraea sisyrinchium (Kosatcovník badilový)

synonyma: *Diaphane edulis*, *Evansia syrtica*, *Gynandriris littorea*, *Gynandriris maricoides*, *Gynandriris numidica*, *Gynandriris sisyrinchium*, *Helixyra sisyrinchium*, *Iris aegyptia*, *Iris collina*, *Iris fugax*, *Iris involuta*, *Iris libyca*, *Iris maricoides*, *Iris samaritani*, *Iris sisyrinchium*, *Iris sisyrinchium* f. *alba*, *Iris sisyrinchium* f. *caerulea*, *Iris sisyrinchium* f. *rosea*, *Iris sisyrinchium* f. *violacea*, *Iris sisyrinchium* subsp. *fugax*, *Iris sisyrinchium* var. *major*, *Iris sisyrinchium* var. *marmarica*, *Iris sisyrinchium* var. *minor*, *Iris sisyrinchium* var. *purpurea*, *Iris sisyrinchium* var. *syrtica*, *Iris syrtica*, *Iris todaroana*, *Iris zelantea*, *Moraea sicula*, *Moraea tenoreana*, *Sisyrinchium majus*, *Xiphion sisyrinchium*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Afganistán, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Egypt, Irák, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Maroko, Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tádžikistán, Tunisko, Turecko

Roste od středozeří po Írán, Afghánistán a Pákistán jako trvalka. Dorůstá výšky 5 - 40 (i 60)cm. Pod zemí má kulovitou vláknitou hlízu o průměru (1 -) 1,5 - 3cm. Vytváří 2 čárkovité rýhované pochvaté listy délky 10 - 40 (i 50)cm a šířky 0,5 - 0,8 (i 1)cm. Kvete modrofialovými květy po (1 -) 2 - 4 (i 6)ti ks s bílými, žlutými nebo oranžovými skvrnami v úžlabí listenů s krátkou trubkou, vnější korunní lístky jsou dlouhé 2,5 - 3,5cm, jsou mírně ohnuté zpět, mají bílou bázi se žlutými skvrnami, vnitřní lístky jsou užší a vzpřímené. Plodem je tobolka délky 1,5 - 2 (i 4)cm, šířky 5mm a obsahuje eliptická zploštělá hnědě černá semena délky 1,5 - 3mm.

Vyhovují mu suché trávníky, okraje křovin, písčiny a dokáže růst i v zasolených místech.

<https://www.rostliny.net/>