

Iris variegata (Kosatec různobarvý)

synonyma: *Iris benacensis*, *Iris flavescens*, *Iris lepida*, *Iris leucographa*, *Iris limbata*, *Iris mangaliae*, *Iris reginae*, *Iris rudskyi*, *I. subsp. leucographa*, *I. var. foienii*, *I. var. pontica*, *I. var. tirnavae*, *Iris x squalens subsp. lepida*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Itálie, Maďarsko, Massachusetts, Německo, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina

Roste ve střední Evropě a v Panonské nížině. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 40 (i 45)cm. Pod zemí vytváří oddenek sahající do hloubky až 10cm. Lodyha je pouze na vrcholu chutě větvená. Listy jsou tmavě zelené a široké 1 - 3cm. Kvete po 2 - 3 květech, vlastní květy jsou žluté až žlutobílé, široké 5 - 7cm, vnější korunní cípy fialově nebo hnědočerveně žilkované, vnitřní celé žluté a dolní listeny zelené. Plodem je tobolka délky 2,2 - 2,8cm a šířky 1 - 1,3cm. Patří mezi vzácné druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aurea Variegata'
- 'Blue Shimmer'
- 'Gracchus'
- 'Mary Vernon'
- var. *pontica*
- var. *reginae* - Maďarsko
- 'Staten Island'
- var. *variegata*

Vyhovují mu křovinaté stráně, stepi, okraje světlých doubrav, písčiny, atp.

<https://www.rostliny.net/>