

Iris graminea (Kosatec trávovitý)

synonyma: *Chamaeiris graminea*, *Chamaeiris graminea* subsp. *pseudocyperus*, *Iris adamii*, *Iris bayonnensis*, *Iris compressa*, *I. subsp. sylvatica*, *I. var. bayonnensis*, *I. var. latifolia*, *I. var. pseudocyperus*, *I. var. sylvatica*, *Iris lamprophylla*, *Iris nikitensis*, *Iris pseudocyperus*, *Iris pseudograminea*, *Iris suavis*, *Iris sylvatica*, *Limniris graminea*, *Xiphion gramineum*, *Xyridion gramineum*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Bulharsko, Česká republika, Dagestán, Francie, Gruzie, Itálie, Jugoslávie, Krym, Maďarsko, Malá Asie (Anatolie), Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Z Rusko

Roste od Španělska po západní Rusko. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 30 (i 60)cm. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Lodyha je 2řízně zploštělá až 2křídla a je kratší než přízemní listy. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, dlouhé (0,3 -) 0,35 - 0,7 (i 1)m, široké 0,5 - 1,5cm, po odkvětu rozprostřené po zemi. Kvete modře růžově fialovými aromatickými květy po 1 - 10ti ks o průměru 8cm s bílými žilkami, vnější korunní lístky jsou vejčité, zakulacené, dlouhé 3 - 5cm, na bázi uprostřed bílé, vnitřní lístky jsou dlouhé 2 - 5cm a na bázi hnědé. Plodem je tobolka délky 3 - 4cm obsahující hruškovitá semena. Vydává meruňkové aroma. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Achtaroffii'
- 'Adami'
- 'Colchica'
- 'Graminea Lamprophylla'
- 'Graminea Sylvatica'
- 'Graminea Latifolia'
- 'Gravenia'
- 'Hort's Variety'
- 'Pseudocyperus'

Vyhovují mu sušší až vlhké trávníky, křovité stráně, louky a pastviny v polostínu s dobře propustnou půdou s neutrálním až mírně kyselým pH. Odolává teplotám do -20°C.

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>