

Iris lactea

synonyma: *Eremiris lactea*, *Iris fragrans*, *Iris haematophylla*, *Iris longispatha*, *Iris moorcroftiana*, *Iris oxypetala*, *Iris sibirica* subsp. *triflora*, *Iris sibirica* var. *haematophylla*, *Iris triflora*, *Joniris fragrans*, *Joniris longispatha*, *Joniris triflora*, *Xiphion triflorum*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Afganistán, Anhui, Gansu, Hebei, Heilongjiang, Henan, Himálaj, Hubei, Jiangsu, Jilin, Kašmír, Kazachstán, Korea, Ladak, Liaoning, Mongolsko, Ningxia, Pákistán, Přímořský kraj, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Střední Rusko, Vnitřní Mongolsko, Xinjiang, Xizang (Tibet)

Pochází ze slanisek a pouští střední Asie, Koreje, Mongolska, Tibetu, Afganistánu a Pákistánu. Pod zemí vytváří větvený oddenek. Listy jsou vzpřímené, šedě zelené, dlouhé do 45cm a široké 3 - 5mm. Stonek má výšku 5 - 50cm. Květenství je 1 - 2 (i 3)květé, má několik listenů délky 5 - 7,5cm, vlastní světle béžové až růžovofialové (i bílé) květy mají 2 - 9cm stopku, průměr 4 - 6cm a trubku délky 2 - 3mm. Plodem je tobolka délky 2,5 - 7cm se 6ti žebry a obsahuje kulovitá tmavěhnědá semena průměru 5mm. Domorodé obyvatelstvo jej využívá jako krmivo pro velbloudy a pro pletení nádob. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Biglumis'
- 'Chinensis'
- 'Chrysantha' - květy žluté
- 'Ensata Chinensis'
- 'Ensata Grandiflora'
- 'Ensata Grandiflora Alba' - květy bílé
- 'Hyacinthiana'
- 'Illiensis'
- 'Illini Fountain'
- var. *lactea* - květy bílé
- 'Mani'
- 'Moorcroftiana'
- 'Pabularia'
- 'Redundant'

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>