

Iris sanguinea

synonyma: *Iris extremorientalis*, *Iris haematophylla*, *Iris nertschinskia*, *Iris nertschinskia* var. *pumila*, *Iris orientalis*, *Iris polakii*, I. f. *albiflora*, I. f. *sericiflora*, I. f. *tetrapetala*, I. var. *coronalis*, *Iris sibirica* var. *orientalis*, *Iris sibirica* var. *sanguinea*, *Limniris sanguinea*, *Xiphion orientale*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Amur, Bajkal, Burjatsko, Chabarovsko, Čita, Heilongjiang, Hokkaidó, Honšú, Írán, Irkutsk, Jianguo, Jilin, Korea, Liaoning, Magadanská oblast, Mongolsko, Přímořský kraj, Severní Karolína, Šikoku, Vnitřní Mongolsko

Roste v Rusku, Mongolsku, Číně, Koreji a Japonsku. Dorůstá výšky (30 -) 50 - 60 (i 90)cm. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Listy jsou šedě zelené, čárkovité, dlouhé 20 - 60cm a široké 0,5 - 1,3cm. Kvete fialovými až červeně růžově fialovými až modře fialovými (i bílými) květy o průměru 6 - 8cm s tmavými žilkami, vnější korunní lístky mají bázi bílou a žlutou, vnitřní korunní lístky jsou dlouhé 4 - 5cm a široké 1,5cm. Plodem je eliptická nebo válcovitá tobolka délky 3,5 - 5cm a šířky 1,2 - 1,5cm.

Potřebuje vlhké místo dobře propustné mírně kyselé místo, plné slunce (i polostín). Snáší teploty od -3,8°C do -34°C.

Množí se dělením.

<https://www.rostliny.net/>