

Iris sintenisii

synonyma: *Chamaeiris sintenisii*, *Chamaeiris sintenisii* subsp. *lorea*, *Chamaeiris urumovii*, *Iris foetidissima* subsp. *lorea*, *Iris graminea*, *Iris graminea* subsp. *sintenisii*, *Iris graminea* var. *sintenisii*, *Iris lorea*, *Iris urumovii*, *Xyridion sintenisii*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Albánie, Bulharsko, Francie, Jugoslávie, JZ Rusko, Makedonie, Rumunsko, Turecko, Ukrajina

Roste od jihozápadní Evropy po Turecko a jihozápadní Rusko. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Pod zemí vytváří krátký hnědý oddenek. Listy jsou trávovité, stálezelené, dlouhé 10 - 50cm a široké 3 - 5mm. Kvete po 1 - 2 růžově modrých, modře fialových, modrých nebo růžově fialových květech o průměru 5 - 6cm, žilky jsou červeně růžově fialové, bílé nebo béžové, vnější korunní lístky jsou vejčitě eliptické, zakulacené, dlouhé 1,3 - 1,4cm, široké 0,9 - 1,3cm, vnitřní korunní lístky jsou dlouhé 2,5 - 3cm a široké 3 - 5mm. Plodem je podlouhlá tobolka délky 1,5cm, šířky 1cm a se zobákem délky do 2cm.

Vyhovuje mu dobře propustná půda a letní sucho a horko. Snáší teploty do -20°C, vápenec a pH 6,6 - 8,5.

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>