

## Merremia umbellata

synonyma: *Convolvulus aristolochiifolius*, *Convolvulus caracassanus*, *Convolvulus cymosus*, *Convolvulus luteus*, *Convolvulus multiflorus*, *Convolvulus sagittifer*, *Convolvulus umbellatus*, *Ipomoea cymosa*, *Ipomoea mollicoma*, *Ipomoea polyanthes*, *Ipomoea portobellensis*, *Ipomoea sagittifer*, *Ipomoea umbellata*, *M. var. occidentalis*

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Florida, Myanmar (Barma), Portoriko, Střední Asie, SV Indie

Roste v severovýchodní Indii a Bhútánu v podobě později dřevnatějící ovíjivé až rozprostřené rostliny. Kmínky mají délku 1 - 3m. Řapíky jsou dlouhé 1 - 9cm, čepel je vejčitá až podlouhlá, báze mělce srdčitá až uťatá, celková délka 4 - 12cm a šířka 1 - 5cm. Kvete v okoličnatém vrcholíku složeném 1 - 12ti květů. Květy jsou bílé, dlouhé 2 - 4cm. Plodem je vejčitá až kónická tobolka délky 1 - 1,2cm a šířky 8mm. Plodem je tobolka obsahující 5mm semena.

<https://www.rostliny.net/>