

Ficus benjamina (Smokvoň plačící)

synonyma: *F. f. warringiana*, *F. subsp. comosa*, *F. var. benjamina*, *F. var. bracteata*, *F. var. comosa*, *F. var. haematocarpa*, *F. var. nuda*, *Ficus comosa*, *Ficus cuspidato-caudata*, *Ficus cuspidatocaudata*, *Ficus dictyophylla*, *Ficus haematocarpa*, *Ficus lucida*, *Ficus neglecta*, *Ficus nepalensis*, *Ficus nitida*, *Ficus notobor*, *Ficus nuda*, *Ficus papyrifera*, *Ficus parvifolia*, *Ficus pendula*, *Ficus pyrifolia*, *Ficus reclinata*, *Ficus retusa f. nitida*, *Ficus retusa var. nitida*, *Ficus striata*, *Ficus umbrina*, *Ficus xaveri*, *Urostigma benjaminum*, *Urostigma benjaminum var. nudum*, *Urostigma haematocarpum*, *Urostigma neglectum*, *Urostigma nitidum*, *Urostigma nudum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Borneo, Dominikánská Republika, Filipíny, Florida, Hainan, Haiti, Jáva, JV Čína, JZ Čína, Kambodža, Kuba, Laos, Malajsie, Malé Sundy, Melanésie, Myanmar (Barma), Návětrné ostrovy, Nepál, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Portoriko, Queensland, S Indie, Salvador, Severní teritorium, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Tchaj-wan, Thajsko, Tichý oceán, V Himálaj, Vietnam, Závětrné ostrovy

Roste v jihovýchodní Asii v podobě stromu s širokou korunou a rozšířil se i jinde. Je velice oblíbený pro jeho krémovou skvrnitost listů objevující se u některých kultivarů. Tento druh se příležitostně stává stromovým škrtičem, vyklíčí v koruně některého stromu, spouští dolů vzdušné kořeny a propojuje je v těsnou armaturu kolem kmene. Zaškrcuje hostitelskému stromu životně důležitý vzestupný cévní systém, vedoucí lýkem a také mu konkuruje v korunovém prostoru. Hostitel ztrácí životnost, a posléze hyne, zatímco škrtič dále mohutní a plně zaujímá jeho místo. Takové usmrcení hostitele v boji o prostor v porostu tropického pralesa může trvat desítky let. Životní forma škrtičů se vyskytuje také v tropech amerických, kde jejich životní strategii studovali odborníci botanické zahrady v Liberci. Dorůstá výšky 8 - 15m a mnohem větší šířky. Větve jsou převislé. Borka je hladká, v mládí šedozelená. Palisty jsou párovité, kopinaté, špičaté a dlouhé 0,8 - 1 (i 1,2)cm. Listy jsou mírně kožovité, tuhé, podlouhlé, eliptické až vejčité kopinaté, špičaté, tmavě zelené, lesklé, dlouhé (3 -) 5 - 10 (i 13)cm, široké 2 - 6cm, báze tupá až zaoblená, spodní strana bledší, okraj mírně zvlněný a řapíky jsou dlouhé 1 - 2 (i 2,5)cm. Plody bývají přisedlé, eliptické, obvejčité nebo vejčité (i kulovité), samostatné nebo párovité a v průměru mají (0,8 -) 1,2 - 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *benjamina*/*F. cuspidatocaudata*/*F. nitida*/*Urostigma benjamina* - koruna široká; výška do 20m; plody holé o průměru 0,8 - 1,5cm
- 'Bushy King' - kompaktní habitus
- 'Bushy Prince' - kompaktní habitus
- 'Crestata'
- 'Exotica'/*F. exotica* (Smuteční fíkus) - převislé větve; listy mají dlouhou zkroucenou špičku
- 'Florida Spire' - úzce sloupovitý habitus; listy zelené
- 'Foliolate' - tvar pyramidy
- 'Golden King' - úzký pyramidální habitus; listy převážně zelené, okraje mohou být bělavé
- 'Gold Princess' - nižší strom; listy eliptické šedozelené s mírně béžovým okrajem
- 'Hawaii' - nízký strom; krátké, větve šikmo vzhůru zakřivené
- 'Indica' - větve rozkladité; listy úzce eliptické
- 'Jacqueline' - listy ve středu šedozelené, na okraji nerovnoměrně žlutobéžové a světle šedozelené, širší než u 'Golden Princess'
- 'Judith'
- 'Kinky' - okraje lehce světle pančované, špičaté listy
- 'Lutzky'
- 'Major' - listy velké, eliptické
- 'Monika'

- 'Natasha' - větve rozložené do šířky, list je špičatý s okraji do tvaru V
- 'Nina'
- var. nuda/var. comosa/F. comosa/F. nuda/F. philippinensis - listy úzké, dlouze špičaté; plody bílé až červenohnědé, s průměrem 1,8 - 2cm, holé nebo ochlupené, báze zúžená a kroucená
- 'Profit' - listy bíle pestré
- 'Reginald' - zlatožluté a zlatozelené listy s tmavými skvrnkami podél středu
- 'Rianne' - rozložitě větve a zelený špičatý list
- 'Rijsenhout' - šikmo rostoucí větve vzhůru
- 'Rysenhout' - větve rozkladité, vystoupavé
- 'Spearmint' - listy pestré, podobá se 'Jacqueline'
- 'Starlight'/'Retusa' - výraznou skvrnitost
- 'Variegata' - hustě větvený strom s kulovitou korunou; větve slabé, převislé; listy drobné, vejčité, špičaté, zelené a bíle skvrnité
- 'Wasana'
- 'Wivian Daniel'

Vyžaduje rozptýlené světlo až polostín, teplotu 20 - 25°C (na zimu 18°C). Díky svému původu z tropického pralesa má rád vyšší vlhkost. Roste jej vodou o pokojové teplotě. Neumisťujte jej nad radiátor atp. Používejte mírně kyselý substrát pro pokojové rostliny. Zalévejte odstátou měkkou vodou. Hnojí se 1x za 14 dní. Nesnáší průvan a časté přemísťování. Přesazuje se až když kořeny vyplní květináč, u starších rostlin stačí vyměnit vrchní substrát. Lze pěstovat i hydroponicky.

Množí se řízků vloženými do vody anebo hřížením.

<https://www.rostliny.net/>