

Araujia

čeleď: Apocynaceae

Pochází z Jižní Ameriky. Rodové jméno bylo vybráno na počest portugalského amatérského botanika jménem António de Araújo e Azevedo (1754 - 1817). Roste v podobě stálezelených ovíjivých keřů či lián. Bývá olistěná již od země. Kvete růžovými nebo bílými květy zvonkového tvaru. Plody jsou tlusté, kožovité, hruškovité, občas i nafouklé měchýřky nebo lusky. Nejznámějším druhem je *A. sericifera*.

Vyhovuje jí plné slunce a úrodná dobře propustná půda. Není mrazuvzdorná.

Množí se semeny nebo stonkovými řízkami.

Araujia angustifolia

synonyma: *Lagenia angustifolia*, *Physianthus angustifolius*

oblasti: Uruguay

Pochází z Uruguaye. Listy mají úzce kopinatý až šípovitý tvar se špičkou. Kvete zvonkovými květy v barvě zelenobílé až růžovofialové.

Araujia graveolens

synonyma: *Physianthus auricularis*, *Schubertia graveolens*

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Povrch je žlutě ochlupený. Roste v podobě popínavé rostliny. Listy mají obvejčitý tvar se srdčitou bází a délkou do 11,5cm. Kvete bílými nálevkově tvarovanými květy o průměru 5 - 6cm.

Araujia hortorum

synonyma: *A. sericifera* f. *hortorum*, *A. sericifera* var. *hortorum*, *A. undulata*

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Kmínky jsou žebernaté, v mládí hustě bíle ochlupené. Vstříčné listy mají dlouzevejčitý až trojúhelníkový tvar s uťatou nebo mělkou srdčitou bází, spodní strana je přitiskle ochlupená, vrchní je světlezelená, celková délka je 5 - 10cm a šířka 2,5 - 5cm. Řapíky mají délku 2 - 3cm. Kvete bílými nebo béžovými květy o průměru 2 - 3cm. Okvětní lístky mají tvar srdčitý. Plody mají vejčitý tvar délky do 12cm, průměru do 5cm a obsahují tmavěhnědá semena.

Araujia megapotamica

synonyma: *A. fusca*, *A. fusca* var. *pallidiflora*, *Lagenia megapotamica*, *Physianthus megapotamicus*

Araujia plumosa

Araujia sericifera

synonyma: Apocynum volubine, A. albens, A. calycina, A. sericifera f. calycina, A. sericifera f. hortorum, A. sericofera, Physianthus albens, Schubertia albens

oblasti: Andalusie, Argentina, Austrálie, Brazílie, Georgia, Jihoafrická Republika (JAR), Kalifornie, Katalánsko, Nový Zéland, Paraguay, Peru, Uruguay

Pochází z Jižní Ameriky. Byla ale introdukována do Evropy, JAR, Kalifornie, Georgie, Argentýny, Brazílie, Paraguayi, Uruguayi, Austrálii a na Nový Zéland. Jedná se o rychle rostoucí plazivou trvalku a liánu dorůstající výšky (2 -) 5 - 7 (i 10)m. V mlátí je rostlina hustě krátce ochlupená. Vstřícné listy jsou kožovité, řapíkaté, mají tmavězelenou barvu, podvinutý okraj, téměř 3úhelníkový tvar se špičkou, délku (3,5 -) 4 - 8 (i 12)cm, šířku (1,3 -) 1,5 - 3,5 (i 6)cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Kvete oboupohlavnými zvonkovými květy průměru 1,5 - 2,5cm po 2 - 8ks v hroznech či latách o délce do 5cm s kalichem o průměru 2cm a tvoří jej 5 okvětních lístků světlé béžové barvy s vnitřní stranou zbarvenou do růžova. Plodem je lusk, má hruškovitý tvar délky 8 - 10 (i 12)cm, průměru 5 - 7cm a obsahuje velké množství černých ochlupených semen velikosti 3,5cm. Při poranění roní bílé lepkavé mléko.

Potřebuje plné slunce nebo polostín.

Množí se semeny.

Araujia subhastata

Další informace:

<http://botany.cz/cs/araujia-sericifera/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1495>

<https://www.rostliny.net/>