

Araujia sericifera

synonyma: Apocynum volubine, Araujia albens, Araujia calycina, A. f. calycina, A. f. hortorum, Araujia sericofera, Physianthus albens, Schubertia albens

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Andalusie, Argentina, Austrálie, Brazílie, Georgia, Jihoafrická Republika (JAR), Kalifornie, Katalánsko, Nový Zéland, Paraguay, Peru, Uruguay

Pochází z Jižní Ameriky. Byla ale introdukována do Evropy, JAR, Kalifornie, Georgie, Argentíny, Brazílie, Paraguayi, Uruguayi, Austrálii a na Nový Zéland. Jedná se o rychle rostoucí plazivou trvalku a liánu dorůstající výšky (2 -) 5 - 7 (i 10)m. V mlátí je rostlina hustě krátce ochlupená. Vstříčné listy jsou kožovité, řapíkaté, mají tmavězelenou barvu, podvinutý okraj, téměř 3úhelníkový tvar se špičkou, délku (3,5 -) 4 - 8 (i 12)cm, šířku (1,3 -) 1,5 - 3,5 (i 6)cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Kvete oboupohlavnými zvonkovými květy průměru 1,5 - 2,5cm po 2 - 8ks v hroznech či latách o délce do 5cm s kalichem o průměru 2cm a tvoří jej 5 okvětních lístků světlé béžové barvy s vnitřní stranou zbarvenou do růžova. Plodem je lusk, má hruškovitý tvar délky 8 - 10 (i 12)cm, průměru 5 - 7cm a obsahuje velké množství černých ochlupených semen velikosti 3,5cm. Při poranění roní bílé lepkavé mléko.

Potřebuje plné slunce nebo polostín.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>