

Abrus (Soterek)

čeleď: Fabaceae

Roste v Africe a výjimku tvoří několik druhů z Asie.

Abrus aureus

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru.

Abrus baladensis

oblasti: Somálsko

Pochází ze Somálska.

Abrus bottae

oblasti: Jemen, Saudská Arábie

Pochází ze Saudské Arábie a Jemenu.

Abrus canescens

oblasti: Afrika

Pochází z Afriky.

Abrus cantoniensis

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

Abrus diversifolius

synonyma: A. acutifolius

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru.

Abrus diversifoliolatus

Abrus fruticosus

synonyma: *A. acutifolius*, *A. gracilis*, *A. madagascariensis* var. *typicus*, *A. precatorius* var. *latifoliolatus*, *A. precatorius* var. *villosula*, *A. pulchellus* f. *latifoliolata*, *A. pulchellus* f. *melanosperma*, *A. pulchellus* f. *typica*, *A. pulchellus* var. *latifoliolata*, *A. repens*, *Hoepfneria africana*

oblasti: Indie, Střední Asie

Pochází z Indie.

Abrus gawenensis

oblasti: Somálsko

Pochází ze Somálska.

Abrus laevigatus

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR.

Abrus longibracteatus

oblasti: Laos, Vietnam

Pochází z Laosu a Vietnamu.

Abrus lusorius

Abrus madagascariensis

synonyma: *A. madagascariensis* var. *dunensis*

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru.

Abrus parvifolius

synonyma: *A. madagascariensis* var. *parvifolius*

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru.

Abrus precatorius (Soterek obecný)

synonyma: *A. abrus*, *A. cyaneus*, *A. maculatus*, *A. minor*, *A. pauciflorus*, *A. precatorius* var.

novo-guineensis, A. squamulosus, A. tunguensis, Glycine abrus

oblasti: Alabama, Arkansas, Austrálie, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Indie, Jemen, JV Asie, Pákistán, Portoriko, Srí Lanka, Tropická Afrika

Roste v tropické Asii, Americe a Africe. Jedná se o popínavou bylinnou liánu. Stonek je větvený, holý (i řídce bíle ochlupený). Palisty jsou čárkovité, dlouhé 3,5 - 6mm. Listy jsou střídavé, sudozpeřené, dlouhé 5 - 10cm, řapíky dlouhé 0,6 - 1,2cm, tvoří je 8 - 13 (i 20)ti párů lístků, vlastní lístky jsou eliptické, dlouhé 1 - 2cm, široké 0,4 - 0,8cm a krátce řapíčkaté. Květenstvím je 3 - 8cm dlouhý hrozen, vlastní květy mají zvonkovitý drobně 4zubý kalich délky 2,5mm, koruna je světle růžovofialová a pavéza dlouhá 1cm. Plodem je lusk délky 2 - 3,5 (i 4,2)cm obsahující (2 -) 3 - 5 (i 6) eliptických, lesklých semen červené barvy délky 7 - 8mm s černým koncem na straně stopky.

Vyskytuje se v křovinách, okrajích toků, polí, cest, atp. v narušené půdě.

Množí se semeny.

Abrus pulchellus

synonyma: A. stictosperma, A. stictospermus

oblasti: Afrika

Pochází z Afriky.

Abrus sambiranensis

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru.

Abrus schimperi

oblasti: Afrika

Pochází z Afriky.

Abrus somalensis

oblasti: Somálsko

Pochází ze Somálska.

Abrus wittei

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Pochází ze Zairu.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/abrus-precatorius/>

<https://www.rostliny.net/>