

## Iris aphylla (Kosatec bezlistý)

synonyma: I. f. major, I. subsp. dacica, I. subsp. fieberi, I. subsp. hungarica, I. subsp. nudicaulis, I. var. polonica, Iris babadagica, Iris bifurca, Iris bisflorens, Iris bohemica, Iris breviscapa, Iris clusiana, Iris dacica, Iris diantha, Iris duerinckii, Iris extrafoliacea, Iris falcata, Iris fieberi, Iris furcata, Iris furcata var. diantha, Iris hungarica, Iris hungarica f. minor, Iris hungarica subsp. dacica, Iris hungarica var. subtriflora, Iris melzeri, Iris nudicaulis, Iris nudicaulis subsp. fieberi, Iris nudicaulis var. clusiana, Iris perrieri, Iris polonica, Iris reflexa, Iris rigida, Iris sabina, Iris schmidii, Iris subtriflora, Iris tenorei

čeleď: Iridaceae

oblasti: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Francie, Gruzie, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Karpaty, Kavkaz, Maďarsko, Missouri, Moldávie, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

Roste ve střední a východní Evropě. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 30 (i 50)cm. Lodyha je od báze větvená. Listy jsou široké a na zimu odumírají. Kvete modrofialovými až červenofialovými květy až po 5ti ks (dokáže občas i remontovat), vnější i vnitřní korunní cípy mají červenohnědé žilkování a dolní listeny na okraji mají úzký suchomázdřitý lem. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. aphylla (Kosatec bezlistý pravý) - vnější korunní cípy modrofialové, široké 2 - 3cm, korunní trubka max. 2x delší než semeník; semeníky a tobolky 6tihranné; vápnité a diabasové skály a stepi; C2
- subsp. bohemica (Kosatec bezlistý český)
- subsp. fieberi (Kosatec bezlistý Fieberův/Kosatec bezlistý čedičový) - endemit Českého středohoří; vnější korunní cípy fialové, široké 1,5 - 2cm, korunní trubka stejné délky jako semeník nebo kratší; semeníky a tobolky mají 3 hluboké brázdy; čedičové skály na plném slunci; C1
- subsp. hungarica (Kosatec bezlistý uherský) - Karpaty a Panonská nížina, Rumunské, Maďarské, Slovensko, Ukrajina, Moldávie a Itálie; výška 10 - 30cm; oddenek průměru 1,8 - 2,2cm; přízemní listy zašpičatělé, široké 1 - 3cm; vnější korunní lístky široké 2 - 3cm; tobolka délky 4 - 5mm a šířky 3mm, semena vejčitá
- subsp. novakii (Kosatec bezlistý opukový) - výška 10 - 15cm; lodyha 1květá; listy kratší než květonosná lodyha; korunní trubka 2x delší semeníku; opukové stráně na plném slunci; C1

Vyhovuje mu dobré propustná půda. Je odolnější na vlhkou půdu během zimy.

Množí se semeny.