

## Acoelorrhaphe wrightii

synonyma: *Acanthosabal caespitosa*, *Acoelorrhaphe arborescens*, *Acoelorrhaphe arborescens*, *Acoelorrhaphe pinetorum*, *Acoelorrhaphe wrightii* f. *inermis*, *Acoelorrhaphe wrightii* var. *novogeronensis*, *Brahea psilocalyx*, *Copernicia wrightii*, *Paurotis androsana*, *Paurotis arborescens*, *Paurotis psilocalyx*, *Paurotis schippii*, *Paurotis wrightii*, *Serenoa arborescens*

čeleď: Arecaceae

oblasti: Belize, Florida, Guatemala, Honduras, JV Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Nikaragua

Roste v trsech ve střední Americe na jihovýchodě Mexika, v Karibiku, na Bahamách a jižní Floridě. Dorůstá výšky 5 - 7 (i 9)m a šířky i 8m. Vytváří 2 - 15 nebo i více kmínků pokrytých prstencovými jizvami po odumřelých listech. Mají v průměru 5 - 15cm. Koruna je tvořená z 10 - 16ti listů. Listy jsou dlaniťe dělené, světlezelené, čepele dlouhé 0,6 - 0,9 (i 2)m, spojené do 1/2 jejich délky, na spodní straně stříbřité, řapík má oranžovou barvu, ostře zubaté okraje a délku 1 - 1,2m. Báze je tvořená hustým tmavěhnědými vlákny. Kvete v až 1m vzpřímeném květenství přesahujících délkou i listy a vlastní květy jsou bílobéžové. Plody jsou oranžové, přecházejí do černé, velikosti 0,5 - 1,2cm.

Potřebuje pravidelně zaplavovaná místa, teplo a plné slunce (snáší i polostín). Substrát by měl být neutrální nebo slabě kyselý, těžký nebo písčítý, ale určitě bohatý na živiny. Toleruje i zasolené půdy a vítr.

<https://www.rostliny.net/>