

Pavonia subrotunda

synonyma: *Asterochlaena orbicularis*, *Asterochlaena orbicularis* var. *decumbens*, *Asterochlaena orbicularis* var. *ekmanii*, *Pavonia orbicularis*

čeleď: Malvaceae

oblasti: Argentina, J Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii, Paraguayi a Argentině v podobě poléhavého polokeře. Kmínky jsou plazivé a ochlupené. Palisty jsou šídlovité a dlouhé 4 - 8mm. Listy jsou kulaté, tupé nebo špičaté, vroubkovaně zubaté, dlouhé 1,5 - 5cm, široké 2 - 6,5cm, báze je hluboce srdčitá, žilnatina dlanitě 7mižilná a řapíky jsou dlouhé 1 - 6cm. Kvete samostatnými úžlabními květy na 2 - 9cm stopce, mají 9 - 11 úzce kopinatých drobně ochlupených listenů délky 0,6 - 1cm, šířky 1mm, mohou být lepkavé, kalich je ochlupený, dlouhý 0,7 - 1cm, koruna je žlutá s červeným středem, dlouhá 1,5 - 2,5cm a na okraji nehtu ochlupená. Plody mají průměr 0,9 - 1cm, plůdky jsou síťnaté, vysoké 5 - 6mm a semena jsou dlouhá 5mm.

<https://www.rostliny.net/>