

Adenia bequaertii

čeleď: Passifloraceae

oblasti: Angola, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Kamerun, Keňa, Republika Kongo, Rwanda, Středoafriická Republika, Uganda

Roste v Keni, Ugandě, Angole, Burundi, Kamerunu, Středoafriické Republice, Demokratické Republice Kongo, Republice Kongo, Gabonu a Rwandě v podobě popínavky. Dorůstá délky až 20m při průměru stonku při bázi do 10cm. Palisty jsou dlouhé 0,5 - 1 (i 1,5)mm. Listy jsou v horní 1/2 vejčité, špičaté, dlouhé 2,5 - 12cm, široké 1,5 - 9cm, báze zakulacená až srdčitá, s 3 (i 5)ti žilkami. Květenství má až 40 samčích květů, 2 - 4 samičí, stopku délky (0,5 -) 2 - 16cm, samčí květy jsou zvonkovité, kališní lístky úzce kopinaté, zašpičatělé, dlouhé (0,6 -) 0,8 - 1,1cm, široké 2 - 3mm, korunní lístky jsou obkopinaté, zašpičatělé až špičaté, dlouhé (0,6 -) 0,8 - 1 (i 1,1)cm, se 3 - 5ti žilkami, samičí květy jsou zvonkovité, kališní lístky jsou úzce kopinaté, zašpičatělé až špičaté, při vrcholu pilovité, dlouhé 5 - 7mm, s (1 -) 3mi žilkami. Plodenství je 1 - 3četné, vlastní plody vejčité, zašpičatělé, dlouhé 3 - 5cm, široké 1,7 - 2,5 (i 3)cm a obsahuje 50 - 60 vejčitých semen délky 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. bequaertii
- subsp. macranthera
- subsp. occidentalis

<https://www.rostliny.net/>