

Salvia fruticosa

synonyma: *Salvia baccifera*, *Salvia clusii*, *Salvia cypria*, *S. subsp. cypria*, *S. subsp. thomasii*, *Salvia incarnata*, *Salvia libanotica*, *Salvia lobryana*, *Salvia marrubioides*, *Salvia ovata*, *Salvia sipylea*, *Salvia subtriloba*, *Salvia sypilea*, *Salvia thomasii*, *Salvia triloba*, *Salvia triloba subsp. calpeana*, *Salvia triloba subsp. libanotica*, *Salvia triloba var. calpeana*, *Sclarea triloba*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Albánie, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Asie, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Řecko, Sicílie, Sýrie, Turecko

Roste od Kanárských ostrovů přes severní Afriku po střední východ v podobě bohatě větveného žláznatě ochlupeného až plstnatého keře. Listy jsou jednoduché až peřenoklané, vejčité až kopinaté nebo podlouhlé, svrasklé, dlouhé do 5cm, terminální úkrojek eliptický až podlouhlý, ostatní v 1 - 2 párech, spodní strana plstnatá a řapíky jsou dlouhé do 3cm. Květenstvím je lata nebo hrozen délky do 20cm, je složený z 2 - 8mičetných lichopřeslenů, listeny jsou dlouhé do 7mm, kalich má délku do 9mm, koruna je růžová až fialová (i bílá) a dlouhá 1,6 - 2,5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *thomasii* - endemit Itálie

<https://www.rostliny.net/>