

Salvia verbenaca (Šalvěj sporýšová)

synonyma: Gallitrichum anglicum, Gallitrichum arvale, Gallitrichum candollei, Gallitrichum clandestinum, Gallitrichum dichroanthum, Gallitrichum horminioides, Gallitrichum maculatum, Gallitrichum pallidiflorum, Gallitrichum ptychophyllum, Gallitrichum rosulatum, Gallitrichum rubellum, Gallitrichum stereocaulon, Gallitrichum verbenacum, Gallitrichum virgatum, Horminum parviflorum, Horminum sylvestre, Horminum verbenaceum, Horminum verbenacum, Larnastyra claytonii, Larnastyra verbenaca, Salvia acutata, Salvia agrestis, Salvia ambigua, Salvia anglica, Salvia anselmi, Salvia anselmii, Salvia barcinonensis, Salvia barnolae, Salvia basillii, Salvia betonicifolia, Salvia byzantina, Salvia candollei, Salvia ceratophylla, Salvia clandestina, Salvia clandestina subsp. multifida, Salvia clandestina var. angustifolia, Salvia clandestina var. clandestina, Salvia clandestina var. hiemalis, Salvia clandestina var. obtusata, Salvia clandestina var. pallidiflora, Salvia clandestinoides, Salvia claytonii, Salvia cleistogama, Salvia collina, Salvia controversa, Salvia discolor, Salvia disermas, Salvia domenechii, Salvia dubia, Salvia electa, Salvia eriocaulis, Salvia erosa, Salvia fontii, Salvia gracilis, Salvia hiemalis, Salvia horminioides, Salvia illyrica, Salvia intricata, Salvia laciniata, Salvia linnaei, Salvia lowei, Salvia mediterranea, Salvia multifida, Salvia multifida var. delicatula, Salvia neglecta, Salvia oblongata, Salvia obtusata, Salvia ochroleuca, Salvia pallidiflora, Salvia parviflora, Salvia polymorpha, Salvia praecox, Salvia pyrenaica, Salvia rhodantha, Salvia rugosissima, Salvia sabulicola, Salvia sennenii, Salvia sibthorpii, Salvia spielmanniana, Salvia spielmannii, Salvia subscaposa, Salvia theodori, Salvia variabilis, S. subsp. battandieri, S. subsp. clandestina, S. subsp. controversa, S. subsp. foetens, S. subsp. horminioides, S. subsp. multifida, S. subsp. oblongata, S. subsp. ochroleuca, S. subsp. sabulicola, S. var. amplifrons, S. var. anglica, S. var. australis, S. var. clandestina, S. var. controversa, S. var. delicatula, S. var. disermas, S. var. horminioides, S. var. multifida, S. var. oblongata, S. var. serotina, S. var. sinuata, S. var. spielmannii, S. var. vernalis, Salvia verbenacoides, Salvia verbenifolia, Salvia viviani, Salvia vivianii, Salvia weihaiensis, Sclarea decidua, Sclarea rhodantha, Sclarea verbenaca, Sclarea viscosissima

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Georgia, Gruzie, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Maryland, New Jersey, Nizozemí, Pennsylvania, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Virginie

Roste v jižní a jihozápadní Evropě a západní Asii jako trvalka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 70 (i 80)cm. Pod zemí vytváří hlízu. Povrch je v horní části žláznatě ochlupený. Stonek může být větvený a 4hranný. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou obrysem vejčité, zpeřeně asymetricky tupě zubaté až vroubkované a dlouze řapíkaté, lodyžní listy jsou vstřícné, vejčité, zpravidla symetricky zpeřené, vroubkovaně zubaté a max. krátce řapíkaté. Květenstvím je (5 -) 6 - 10tičetný lichopřeslen v klasu, vlastní květy jsou oboupohlavné, kalich má délku 0,7 - 1,2cm, 2 pysky, kališní cípy zašpičatělé, koruna je bleděmodrá až růžovofialová (i bílá), krátce trubkovitá, dlouhá 2 - 3,5cm a horní pysk jen mírně větší než spodní. Plodem je tvrdka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. controversa
- subsp. horminioides
- subsp. verbenaca (Šalvěj sporýšová pravá)

Vyhovují jí úhory, okraje cest, vinice, garigue a řídké borové lesy.

<https://www.rostliny.net/>