

Fraxinus caroliniana

synonyma: *Calycomelia caroliniana*, *Calycomelia pallida*, *Calycomelia platycarpa*, *Fraxinus americana* var. *caroliniana*, *Fraxinus americana* var. *triptera*, *F. f. hypomalaca*, *F. f. lasiophylla*, *F. f. pubescens*, *F. subsp. cubensis*, *F. var. cubensis*, *F. var. oblanceolata*, *F. var. platycarpa*, *F. var. pubescens*, *Fraxinus cubensis*, *Fraxinus curvidens*, *Fraxinus floridana*, *Fraxinus nigra* subsp. *caroliniana*, *Fraxinus nigrescens*, *Fraxinus nuttallii*, *Fraxinus pallida*, *Fraxinus palustris*, *Fraxinus pauciflora*, *Fraxinus pennsylvanica* subsp. *cubensis*, *Fraxinus pennsylvanica* var. *cubensis*, *Fraxinus platycarpa*, *Fraxinus platycarpa* var. *floridana*, *Fraxinus platycarpa* var. *oblanceolata*, *Fraxinus platycarpa* var. *pubescens*, *Fraxinus platycarpa* var. *triptera*, *Fraxinus pleurodes*, *Fraxinus triptera*, *Leptalix caroliniana*, *Leptalix pallida*, *Leptalix palustris*, *Leptalix platycarpa*, *Leptalix pleurodes*, *Samaropsis triptera*

čeleď: Oleaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Texas, Virginie

Roste v USA v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 15m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou dlouhé 12 - 30cm, tvoří je 5 - 7 lístků, vlastní lístky jsou eliptické až mírně vejčité, špičaté, pilovité, tmavězelené, dlouhé 5 - 10cm, báze klínovitá až kulatá, spodní strana světlejší a šiky jsou bíle ochlupené. Květenstvím je štíhlá lata délky 2 - 4cm a vlastní květy jsou dvoudomé. Plody jsou eliptické až obvejčité, dlouhé do 5cm a široké 1,2 - 1,8cm.

<https://www.rostliny.net/>