

Fraxinus nigra (Jasan černý)

synonyma: Calycomelia nigra, Fraxinoides nigra, Fraxinus americana var. nigra, Fraxinus americana var. sambucifolia, F. f. cucullata, F. var. sambucifolia, Fraxinus sambucifolia, Leptalix nigra

čeleď: Oleaceae

oblasti: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v podobě stromu s úzkou korunou. Dorůstá výšky do 25m. Větve jsou holé a mají pupeny tmavěhnědé až černé. Listy jsou zpeřené, dlouhé do 35cm, tvoří je 7 - 11 přisedlých lístků, vlastní lístky jsou kopinaté, pilovité, zuby dovnitř zakřivené, tmavězelené, dlouhé 7 - 13cm, báze zakulacená a podzimní barva hnědočervená. Květenstvím je řídká široká lata velikosti 4cm, vlastní květy jsou jednopohlavné a bezkorunné. Plody jsou úzce protáhlé, dlouhé 2,5 - 4cm a na vrcholu zakulacené. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Crispa' - keřovitý habitus; větve slabé; listy zkadeřené, husté
- 'Cucullata' - listy nafouklé, zvláštní
- 'Fallgold' - vzpřímený bohatý habitus; listy tmavězelené, na podzim žluté, dlouho vytrvalé; samčí, neplodící

<https://www.rostliny.net/>