

Alnus acuminata

synonyma: A. var. ferruginea, A. var. mirbelii, A. var. spachii, Alnus acutissima, Alnus arguta var. benthamii, Alnus arguta var. ovata, Alnus arguta var. punctata, Alnus castaneifolia, Alnus ferruginea, Alnus ferruginea var. aliso, Alnus ferruginea var. obtusifolia, Alnus jorullensis f. angustifolia, Alnus jorullensis f. macrocarpa, Alnus jorullensis var. acuminata, Alnus jorullensis var. acutissima, Alnus jorullensis var. castaneifolia, Alnus jorullensis var. ferruginea, Alnus jorullensis var. mirbelii, Alnus jorullensis var. spachii, Alnus lanceolata, Alnus lindenii, Alnus mirbelii, Alnus mirbelii var. acutissima, Alnus rufescens, Alnus serrulata var. pumila, Alnus spachii

čeleď: Betulaceae

oblasti: Andy, Argentina, Austrálie, Guatemala, J Mexiko, Nový Zéland, Salvador

Pochází z Guatemale a z And v Jižní Americe v podobě stálezeleného stromu s širokou korunou. Dorůstá výšky do 10 (i 15)m. Borka je tmavěhnědá a hladká. Listy jsou převislé, eliptické až vejčité, špičaté, 2x pilovité, zelené, mohou být drobně ochlupené, dlouhé 7 - 15cm a báze je tupá až zakulacená. Samčí jehnědy jsou dlouhé 5 - 15cm, samičí šištice jsou max krátce stopkaté, dlouhé 1,5 - 3cm a široké 1 - 1,4cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *arguta*/A. *arguta* - jižní Mexiko, Guatema, Salvador; strom; výška do 30m, zpravidla 15m; borka světle, slabá a hladká; větve v mládí max. řídce ochlupené, spíše holé; listy vejčité, špičaté, 2x pilovité, zpravidla mělce laločnaté, široké 3 - 9cm, báze tupá nebo zakulacená; samčí jehnědy dlouhé 4 - 10cm, samičí šištice přisedlé nebo stopkaté, zpravidla dlouhé 2 - 3cm, někdy mírně kratší
- subsp. *glabrata*

Růst je rychlý.

<https://www.rostliny.net/>