

Coprosma (Korálovka)

čeleď: Rubiaceae

Roste na Novém Zélandu, Havajských ostrovech, Borneu, Jávě, Nové Guineji, tichomořských ostrovech, Austrálii a Ostrovech Juana Fernandéze v podobě dvoudomého stálezeleného keře (i menšího stromu). Listy jsou velké, zpravidla kožovité a lesklé a u několika druhů při poranění nepříjemně páchnoucí. Kvete bílými nebo nazelenalými jednopohlavnými květy. Plodem je štavnatá peckovice, nejčastěji oranžové barvy (méně častěji červená nebo světlemodrá) a obsahuje malá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Beatson's Gold' - rozkladitý keř výšky do 2m; listy tmavězelené až smaragdové, délky 1,6cm, šířky 8mm, při centrálním žeburu žluté
- 'Blue Pearl' - hybrid *C. petriei* x *C. acerosa* f. *brunnea*; rozkladitý s krátkými větvemi; drobné listy; průsvitné plody
- 'Chocolate Soldier' - vzpřímené větve; hnědé listy délky do 2cm
- 'Evening Glow' - výšky do 80cm; vejčité až obvejčité lesklé zelené žlutě tečkované listy délky 3cm
- 'Kiwi Gold' - nízký rozkladitý keř výšky 50cm a šířky do 1,8m; listy šířky 2,5cm v barvě žluté až citrónové
- 'Kiwi Silver' - výška 30cm, šířka až 1m; listy eliptické, lesklé, zelenostříbřité (občas i narůžovělé), na okraji žluté
- 'Pride' - lesklé zelenoměďnaté listy se žlutými čárkami
- 'Prostrata' - pouze samčí; rozprostřený až polštářový růst; listy délky do 2cm, šířky 6mm, smaragdovězelená barva
- 'Rainbow Surprise' - široce rozkladitý; výška do 60cm; vejčité tmavězelené listy se světležlutým zvlněným okrajem

Vyhovuje jí vlhká dobře propustná půda a plné slunce.

Množí se semeny nebo 1/2dřevitými řízkami.

Coprosma acerosa

synonyma: *C. acerosa* var. *brunnea*, *C. brunnea*

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Roste v podobě poléhavého stálezeleného keře. Borka je červená. Mladé větve jsou drátovité a olýsávají. Listy mají žlutohnědou barvu, čárkovitý tvar délky 0,4 - 1,8cm, barvu mají nažloutlou až nahnědou a vyrůstají v párech nebo svazečích. Kvete samostanými květy. Samčí i samičí mají nálevkovitou korunu. Plody mají světlemodrou barvu a průměr 4 - 8mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *brunnea*/f. *brunnea*/*C. brunnea* - Nový Zéland; výška do 15cm, šířka až 3m; větve rozkladité, poléhavé, hnědé; listy drobnější, sivozelené; květy drobné, béžové; plodem je modrá bobule

Roste na pobřežních písčitých dunách.

Coprosma acutifolia

oblasti: Tichý oceán

Pochází z Raoul Island a roste v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 12m. Větve jsou vystoupavé. Palisty jsou blanité. Listy mají 5 - 7mm řapíky, vejčitou až vejčitěeliptickou či kopinatou čepel délky 6 - 7,5cm a šířky 2 - 3,5cm. Samčí květy rostou ve skupinkách 3 - 9ks, samičí po 3ks. Plody mají červenooranžovou barvu a délku 7 - 8mm.

Coprosma antipoda

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Větve jsou naředlé, v mládí ochlupené. Palisty mají trojúhelníkovitý tvar a jsou ochlupené. Listy jsou téměř přisedelé, seskupené do svazečků, čepel je čárkovitá se špičkou, dlouhá 1 - 1,3cm a široká 1 - 2mm. Kvete samostatnými květy, samčí nemají kalich. Plody jsou podlouhlé, dlouhé 4mm.

Coprosma arborea

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandě v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 10m. Mladé větve jsou ochlupené. Palisty jsou krátce trojúhelníkovité. Listy mají řapíky délky 0,8 - 2cm, čepel je vejčitá až široce eliptická (i kulatá), dlouhá 2,5 - 6cm a široká 1,5 - 4cm. Samčí květy jsou seskupené v klubíčkách, samičí ve svazečcích po 2 - 4ks. Plod je šťavnatý, bílý až průsvitný, průměru 7mm a obsahuje 2 drobná semena.

Coprosma archboldiana

Coprosma areolata

synonyma: *C. multiflora*

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky až 5m. Mladé větve jsou ochlupené. Palisty jsou drobné. Listy jsou seskupené do svazečků, řapíky jsou křídlaté, jemně ochlupené, dlouhé 3 - 7mm, čepel je vejčitá až široce eliptická či obvejčitá s klínovitou bází, na spodní straně ochlupená, dlouhá 0,5 - 1,7cm a široká 0,3 - 1cm. Kvete samostatnými květy nebo po 2 - 4 v případě samčích. Kulovité plody mají barvu tmavě růžovofialovou až černou a průměr 4 - 5mm.

Coprosma astonii

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Roste v podobě keře o výšce 1 - 2m. Barva větví je hnědá, v mládí jsou ochlupené. Palisty jsou dlouze trojúhelníkovité a ochlupené. Listy jsou čárkovité, kožovité, holé, s 1 - 3mm řapíky a čepelí délky 0,6 - 1,6cm a šířky 0,5 - 3mm. Samčí květy jsou seskupené po 1 - 4 bez kalichů, samičí jsou jednotlivé. Plody jsou kulovité, červené a v průměru mají 4 - 5mm.

Coprosma atropurpurea

synonyma: *C. petriei* var. *atropurpurea*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě polštářových porostů. Větve jsou krátké, vzpřímené. Listy jsou drobné, tmavězelené až bronzové. Plody jsou průsvitně červenofialové a v průměru mají 8mm.

Coprosma banksii

synonyma: *C. myrtillifolia* var. *linearis*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě štíhlého keře. Dorůstá výšky 1 (i 2)m. Mladé větve jsou ochlupené. Palisty jsou široce trojúhelníkovité. Listy mají krátké, seskupené do svazečků, kožovité, čárkovitěpodlouhlé s klínovitou bází, dlouhé 1 - 3cm a široké 2 - 5mm. Kvete samostatnými květy. Samčí jsou zvonkovité, samičí nálevkovité. Plody mají barvu červenou, jsou podlouhlé, dlouhé 6mm.

Coprosma barbata

Coprosma baueri

oblasti: JV Austrálie, Nový Jižní Wales, Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu, v Novém Jižním Walesu a na ostrově Lorda Howa v podobě keře nebo nižšího stromu. Dorůstá výšky až 8m. Mladé větve jsou ochlupené. Listy mají obvejčitý tvar s tupým vroubkovaným koncem, povrch je lesklý, okraje podvinuté a délka je až 8cm. Plody jsou žlutooranžové, vejčité ve velikosti 8mm.

Coprosma benefica

Coprosma billardieri

synonyma: *C. quadrifida*

oblasti: Tasmánie

Roste v Austrálii a Tasmánii v podobě vzpřímeného bohatě větveného dvoudomého keře. Dorůstá výšky 2 - 4m. Listy mají kopinatý nebo podlouhlý či kopinatěeliptický tvar se špičkou délky 0,4 - 2,5cm a krátké řapíky. Kvete samostatnými květy v paždí listů. Plodem je eliptická až kulovitá oranžovočervená lesklá peckovice velikosti 5 - 8mm.

Coprosma bougainvilleensis

Coprosma brassii

Coprosma chathamica

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě stromu o výšce až 15m. Mladé větve jsou hustě ochlupené. Palisty jsou trojúhelníkovité, ochlupené. Listy jsou vejčité až vejčitěpodlouhlé s tupým koncem, barva zelená mírně lesklá a kožovitá, spodní strana bledší, délka dosahuje 3,5 - 7,5cm a šířka 2 - 3,5cm. Samčí květy vyrůstají při sobě v několika ks a mají nálevkovitou korunu, samičí jsou trubkovité ve skupinách 1 - 3ks. Plodem je obvejčitá žlutočervená peckovice velikosti 9mm.

Coprosma cheesemani

synonyma: *C. depressa*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě rozprostřeného keře. Dorůstá výšky až 50cm. Mladé větve jsou ochlupené. Palisty jsou široce trojúhelníkovité. Listy mají krátké řapíky, kožovitou ochlupenou čepel khaki zelené barvy, čárkovitý až úzce podlouhlý tvar se špičkou, okraj hnědočervený, délku 0,8 - 1,2cm a šířku 1 - 2mm. Kveté samostatnými květy. Samčí jsou široce zvonkovité se 4 - 6ti laloky, samičí mají krátkou trubku. Plody mají kulovitý tvar, oranžovočervenou barvu a průměr 6 - 7mm.

Coprosma ciliata

synonyma: *C. ciliata* var. *virgata*, *C. myrtillifolia*

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 3 (i 7)m. Mladé větve jsou ochlupené. Listy mají 1 - 4mm řapíky, ochlupený povrch, tenkou široce vejčitou až oválnou nebo podlouhlou čepel se špičatým nebo tupým koncem, délku 0,6 - 2cm a šířku 0,15 - 1cm. Kveté samostatnými květy v paždí s nálevkovitou korunou, samičí jsou zvonkovité. Poly mají kulovitý až podlouhlý tvar, žlutou barvu a průměr 6 - 7mm.

Coprosma colensoi

synonyma: *C. banksii*, *C. colbanksii*, *C. myrtillifolia* var. *linearis*, *C. pseudocolensoi*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky až 4m. Větve mají tmavou červenohnědou barvu a jsou ochlupené. Řapíky jsou ochlupené, dlouhé 2 - 3cm. Listy jsou hodně variabilní. Čepel je kožovitá, podlouhlá až obvejčitá nebo eliptická s tupým až uťatým koncem, délka dosahuje 0,7 - 2cm a šířka 3 - 8mm. Kveté samostatnými květy, samčí mají zvonkovitý tvar, samičí jsou trubkovité. Plodem je červená peckovice délky 4 - 7mm.

Coprosma cookei

Coprosma crassifolia

synonyma: *C. divaricata* var. *coriacea*, *C. pendula*

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Roste v podobě vzpřímeného keře o výšce 4 (i 5)m. Borka má červenohnědou barvu. Mladé větve jsou ochlupené. Palisty jsou trojúhelníkovité. Listy jsou kožovité, tmavězelené, kulaté s křídlatými 1 - 2mm řapíky a celkovou délkou 0,6 - 2cm a šířkou 0,3 - 1,2cm. Kvete samostatnými květy, samčí jsou ve skupinkách 2 - 4ks s nálevkovitým tvarem, samičí jsou trubkovité. Plody jsou žluté nebo bílé, mají průměr 5 - 6mm a bílá semena.

Coprosma crenulata

synonyma: C. retusa

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě rozprostřeného keře. Větve jsou plazivé, ochlupené a světlešedé barvy. Palisty jsou krátké, stejně jako řapíky. Listy jsou kožovité, obvejčité až obvejčitěpodlouhlé s klínovitou bází, vroubkovaným koncem, délkou 0,9 - 2cm a šířkou 3 - 5mm. Kvete samostatnými květy, samčí jsou nálevkovité dlouhé 6mm. Plody jsou žlutočervené, vejčité, dlouhé 6mm.

Coprosma cuneata

synonyma: C. astonii

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Mladé větve jsou tmavěhnědé, ochlupené a štíhlé. Palisty jsou trojúhelníkovité, ochlupené. Listy jsou seskupené do svazečků, mají kožovitý povrch tmavězelené barvy s bledší spodní stranou, tvar je úzce klínovitý až podlouhlevejčitý s pozvolně zúženou bází, délka dosahuje 0,5 - 1,6cm a šířka 1 - 3,5mm. Kvete samostatnými květy. Plody jsou červené, kulovité o průměru 3 - 6mm.

Coprosma cunninghamii

synonyma: C. foetidissima

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5 - 4m. Listy jsou čárkovité se špičkou nebo mírně ztupělé, dlouhé 1,5 - 5cm. Kvete ve svazečcích po 2 - 12ks na tlustých větvích. Plody jsou žluté o průměru 6mm.

Coprosma cymosa

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma decurva

Coprosma depressa

synonyma: *C. pubens*, *C. ramulosa*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě rozprostřeného keře. Dorůstá výšky až 1m. Větve při styku se zemí znovu kořenují, v mládí jsou ochlupené. Listy jsou ztlustlé, vejčité až obvejčité či kopinaté se špičkou, mají délku 4 - 9mm a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Samčí květy jsou nálevkovité s vejčitými laloky, samičí mají úzce trojúhelníkové. Plodem je kulovitá červená peckovice velikosti 5 - 6mm.

Coprosma divergens

Coprosma dodonaeifolia

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Borka je hnědočervená. Palisty jsou trojúhelníkovité. Listy mají 1 - 2cm řapíky, čepel světlezelenou, lesklou a mírně kožovitou, spodní strana je bledší, tvar je obvejčitý délky 6,5 - 12cm a šířky 2 - 3,5cm. Samičí květy jsou seskupené po 3 do svazečků, koruna není známá. Plody jsou podlouhlé, červenooranžové, dlouhé 6 - 9mm.

Coprosma dumosa

synonyma: *C. parviflora* var. *dumosa*

Coprosma elatirioides

Coprosma elegans

Coprosma elliptica

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma ernodeoides

synonyma: *C. ernodeoides* var. *mauiensis*

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma esulcata

synonyma: *Psychotria esulcata*

Coprosma fernandeziana

synonyma: *Hippotis triflora*, *Psychotria hookeri*, *Uragoga hookeri*

Coprosma foetidissima

synonyma: *C. affinis*, *C. pusilla*, *C. sagittata*

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Roste v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 (i 7)m. Větve jsou křehké. Borka je hnědá. Listy mají řapíky délky 0,8 - 1,5cm, čepel může být až kožovitá, tvar obvejčitý nebo podlouhlý či široce vejčitý s tupým koncem, délka dosahuje 1 - 5cm a šířka 0,8 - 2cm. Kvete samostatnými květy. Samčí mají zvonkovitý tvar délky 1cm, samičí jsou trubkovité. Plody jsou podlouhlé, oranžové, dlouhé 0,7 - 1cm.

Roste při pobřeží subalpinského pásma včetně travin a křovin.

Coprosma foliosa

synonyma: *C. fauriei*, *C. fauriei* var. *lanaiensis*, *C. fauriei* var. *oahuensis*, *C. parvifolia*, *C. skottsbergiana*, *C. stephanocarpa*, *C. vontempskyi*

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma fowerakeri

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Jižním Ostrově Nového Zélandu.

Coprosma glabrata

synonyma: *C. tahitensis* var. *glabrata*

Coprosma granadensis (Korálovka andská)

synonyma: *Gomozia granadensis*, *Nertera depressa*, *Nertera granadensis*, *Nertera granadensis* var. *insularis*

oblasti: Čile, Filipíny, Guatemala, Havajské ostrovy, Indonésie, Malajsie, Nová Guinea, Nový Zéland, Tchaj-wan, V Austrálii, Z Argentina

Roste v Čile, západní Argentíně, severní Guatemale, Novém Zélandu, východní Austrálii, Indonésii, Malajsii, Nové Guineji, Filipínách a Tchaj-wanu. Plodem je oranžová mírně jedovatá bobule.

Vyhovuje jí provzdušněná zemina. Potřebuje světlo a chladno (do 20°C, v zimě kolem 10°C) a bohatou zálivku (v zimě pouze málo). Prospěje jí i rosení. Přesazuje se 1x za 2 roky na jaře.

Množí se dělením nebo semeny.

Coprosma grandifolia

synonyma: *C. autumnalis*, *C. latifolia*, *Ronabea australis*

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě. Dorůstá výšky 6 - 7m. Větve jsou holé. Listy mají 2 - 5cm řapíky, čepel je téměř kožovitá, zelená, spodní strana bledší, tvar je široce eliptický až obvejčitý či podlouhlý, může být i vroubkovaný, délky 1 - 2,2cm a šířky 0,5 - 1,1cm. Kvete ve svazečcích. Samčí jsou nálevkovité, samičí trubkovité. Plodem je červenooranžová podlouhlá bobule délky 7 - 9mm.

Coprosma hirtella

synonyma: *C. cuspidifolia*, *C. venosa*

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Novém Jižním Walesu, Viktorii a Tasmánii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou vzpřímené. Listy jsou kožovité, tvaru široce vejčitého, eliptického nebo obvejčitého se špičkou, celková délka je 2 - 6cm a šířka 1,2 - 3,5cm. Kvete na krátkých stopkách v malých hlávkách s listeny. Plodem je kulovitá peckovice červenočerné barvy o průměru 5 - 7mm obsahující 2 semena.

Coprosma hookeri

synonyma: *C. crassicaulis*

Coprosma huttoniana

oblasti: JV Austrálie

Roste na Ostrově Lorda Howa.

Coprosma inopinata

oblasti: JV Austrálie

Roste na Ostrově Lorda Howa.

Coprosma intertexta

oblasti: J Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu, zejména z východu Jižního Ostrova. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Mladé větve jsou ochlupené, borka světlehnědá. Palisty jsou drobné. Listy mají 1 - 2mm řapíky, čepel úzce podlouhlou až úzce obvejčitou s načervenalým okrajem, délkou 0,7 - 1,5cm a šířkou 1 - 2mm. Samičí květy jsou samostatné v barvě narůžovofialovělé. Plody mají délku 4mm.

Coprosma kauensis

synonyma: *C. pubens* var. *kauensis*, *C. stephanocarpa* var. *kauensis*

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma laevigata

Coprosma lanceolaris

oblasti: JV Austrálie

Roste na Ostrově Lorda Howa.

Coprosma linariifolia

synonyma: *C. propinqua* var. *linariifolia*

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu a ze středu Severního Ostrova a jihu Jižního Ostrova. Roste v podobě keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky až 8m. Dřevo je žluté. Mladé větve jsou ochlupené. Listy mají řapíky délky 1 - 2mm, čepel kožovitou, tmavězelenou na horní straně, spodní je bledší, okraj růžovofialový, tvar je čárkovitý až kopinatý se špičkou, celková délka je 1 - 4cm a šířky 2 - 5mm. Samčí zvonkovité květy jsou seskupené do svazečků po 2 - 5ks, samičí jsou samostatné. Plody mají bíleprůsvitnou barvu a poldouhlý tvar délky 6mm.

Coprosma longifolia

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma lucida

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Jižním i Severním Ostrově Nového Zélandu. Roste v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky 1 - 5 (i 6)m. Borka je červenohnědá. Listy jsou lesklé, kožovité, ztlutlé, zelené, centrální žebro je na horní straně vyniklé, dlouhé 5 - 15 (i 17)cm, široké 2 - 4cm a řapíky mají délku 1 - 3cm. Samčí i samičí květy jsou nálevkovité, samičí jsou žlutozelené a seskupené do 3 - 4ks skupin. Plodem jsou oranžovočervené peckovice délky 0,8 - 1,2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *angustifolia* - úzké obvejčité podlouhlé listy délky 10 - 12cm a šířky 1,5 - 2,5cm

Coprosma macrocarpa

oblasti: S Nový Zéland

Pochází z Three Kings Islands při Novém Zélandu. Roste v podobě keře nebo stromu s rozkladitými větvemi. Dorůstá výšky až 10m. Listy jsou široce vejčité až elipticky podlouhlé se špičkou a zúženou bází, povrch je kožovitý, řapíky jsou dlouhé 1,2 - 2,5cm, čepel je dlouhá 13cm a široká 8cm. Samčí zvonkovité květy jsou seskupené do klubíček, samičí trubkovité vykvétají po 2 - 5ks. Plody jsou podlouhlé až vejčité, oranžovočervené, velké do 2,5cm.

Coprosma menziesii

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma microcarpa

synonyma: *C. margarita*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky až 4m. Mladé větve jsou zploštělé a ochlupené. Borka je tmavěhnědá. Listy mají 1 - 1,5mm řapíky, tmavězelenou čepel se světlejší spodní stranou, tvar je čárkovitý až podlouhlý s tupým nebo mírně špičatým koncem a pozvolně zúžujícím se bází, délka dosahuje 0,5 - 1,5cm a šířka 1 - 3mm. Samčí květy jsou samostatné, nálevkovité až trubkovité, samičí jsou trubkovité. Plody mají smáčkly kulovitý tvar, bílou barvu a průměr 3 - 5mm.

Coprosma montana

synonyma: *C. montana* var. *crassa*, *C. montana* var. *orbicularis*

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma moorei

oblasti: Tasmánie, Viktorie

Roste ve Viktorii a Tasmánii v podobě nižší dřevnaté trvalky. Kmínky mají výšku pouze 6 - 15cm, rozrůstají se do šířky, kořeňují a na konci se bohatě větví. Listy mají vejčitý až kopinatý tvar s tupým nebo špičatým koncem, jsou ztlustlé, holé, dlouhé 3 - 5mm. Květy jsou přisedlé, 4 - 5tičetné, koruna zvonkovitá dlouhá 2 - 3mm. Plodem je modrá kulovitá peckovice o průměru 5 - 6mm.

Coprosma myrtifolia

Coprosma nephelephila

Coprosma niphophila

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Novém Jižním Walesu.

Coprosma nitida

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Novém Jižním Walesu, Tasmánii a Viktorii v podobě hustého rozložitého keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy jsou úzce eliptické až kopinaté s tupým koncem a zúženou bází, povrch je lesklý a kožovitý, na délku má 0,5 - 2cm a šířku 3 - 9mm. Plody jsou červené až oranžové, kulovité nebo

podlouhlé, dlouhé 0,5 - 1cm.

Coprosma nivalis

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste v Novém Jižním Walesu a Viktorii.

Coprosma novaehebridae

oblasti: Tichý oceán

Coprosma obconica

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky až 2m. Borka je šedá. Mladé větve jsou ochlupené. Palisty jsou drobné. Listy vyrůstají ve svazečcích, mají ochlupené 1mm řapíky, kožovitou obvejčitě podlouhlou čepel s tupým koncem, délkou 5 - 7mm a šířku 1,5 - 2mm. Samčí květy vyrůstají po 1 - 3ks bez kalichu, koruna je nálevkovitá. Samičí květy jsou samostatné, trubkovité. Plody jsou obkuželovité, žlutobílé o průměru 3,5 - 4mm.

Coprosma ochracea

synonyma: *C. ochracea* var. *kaalae*, *C. ochracea* var. *rockiana*, *C. pubens* var. *sessiliflora*

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma oliveri

Coprosma papuensis

oblasti: Papua-Nová Guinea

Coprosma parviflora

synonyma: *C. myrtillifolia*

oblasti: S Nový Zéland

Vyskytuje se na Three Kings Island na Novém Zélandě v podobě širokého keře až nízkého stromu. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou rozkladité, v mládí jsou ochlupené. Borka je šedá až bělavá. Vstřícné čárkovité až okrouhlé či obvejčité listy se špičkou jsou kožovité, na vrchní straně světle síťkované, báze je zúžená, řapíky jsou dlouhé do 1mm a čepel je dlouhá 0,4 - 1,8cm. Samčí květy vyrůstají ve skupinách 1 - 3ks bez kalicha s nálevkovitou korunou. Samičí květy jsou samostatné, trubkovité. Plody jsou růžovofialové až bílé či průstvitné, kulovité o průměru 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *dumosa* - husté keře; listy délky 0,4 - 1cm a šířky 0,5 - 2mm; sytě červené kulovité plody průměru 3mm

Coprosma pedicellata

Coprosma perpusilla

oblasti: J Nový Zéland, Nový Jižní Wales, Tasmánie

Roste v Novém Jižním Walesu, Tasmánii, ostrovu Macquarie, Novém Zélandě a některých subarktických ostrovech v podobě epifytu nebo rozprostřeného kobercového polokeře. Palisty mají trojúhelníkový tvar. Listy jsou nahlučňené k sobě, jsou kopinaté nebo vejčité až oválné, leskle zelené, vypouklé, dlouhé 4,5 - 7mm a široké 2 - 3,5mm. Kvete zelenobílými až žlutooranžovými květy s červenými tečkami. Plodem je žlutooranžová až červenooranžová bobule průměru 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *perpusilla* - trojúhelné palisty s chlupatým okrajem
- subsp. *subantarctica* - zaoblené až rozšířené palisty

Coprosma persicifolia synonyma: *C. imthurniana*

Coprosma petiolata

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře nebo stromu o výšce až 6m. Borka je tmavě až světle šedá, v mládí ochlupená. Palisty jsou krátce trojúhelníkové. Listy mají 0,5 - 1,6cm řapíky, čepel kožovitou, světlezelenou, lesklou, tvaru elipticky nebo obvejčité podlouhlého s klínovitou bází. Samčí květy jsou ve svazečcích, chybí kalich, koruna je nálevkovitá. Samičí květy bývají ve skupinách 3ks, koruna je široce trubkovitá. Plody jsou červené a vejčité.

Coprosma petriei

oblasti: Austrálie, Havajské ostrovy, Nový Zéland

Roste v podobě keře na Novém Zélandu, Polynésii, Austrálii, Ostrovech Juana Fernandéze a Havajských ostrovech v kobercových porostech. Dorůstá výšky několika cm, ale v průměru dorůstá až 2m. Listy jsou úzce obvejčité až čárkovité, kožovité, tmavězelené s bledší spodní stranou, okraj může být ztlustlý a délka čepele dosahuje 0,3 - 1cm. Kvete zelinkavými květy. Samčí jsou samostatné, dlouhé 2cm s nálevkovitou korunou. Samičí jsou samostatné s trubkovitou korunou. Plody jsou kulovité, tmavě růžovofialové až fialové, průměru 0,5 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Lyn' - kompaktní; bílé korálkovité plody

- var. petriei - plody namodralé

Coprosma pilosa

synonyma: C. villosa

oblasti: Tichý oceán

Roste na Norfolkku.

Coprosma polymorpha

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Mladé větve jsou ochlupené. Palisty jsou drobné, trojúhelníkovité. Listy mají 1 - 4mm řapíky, čepel vejčitou až eliptickou či kopinatou nebo dokonce čárkovitou s tupějším koncem. Délka dosahuje 0,8 - 2,5cm a šířka 0,1 - 1,2cm. Kvete ve skupinách 1 - 2ks. Samčí jsou bezkališné s nálevkovitou kornunou. Samičí jsou trubkovité. Plody jsou kulovité, tmavěčervené o průměru 3mm.

Coprosma prisca

oblasti: JV Austrálie

Roste na Ostrově Lorda Howa.

Coprosma propinqua

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Roste v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 6m. Mladé větve jsou tenké a ochlupené. Listy mají ochlupené 1 - 2mm řapíky, čepel je kožovitá, tmavězelená se světlejší spodní stranou, tvar je čárkovitý až obvejčitý s tupějším zakončením, délkou 0,7 - 1,6cm a šířkou 2 - 5mm. Samčí květy vyrůstají po 1 - 4 v paždí listů s nálevkovitou korunou. Samičí vyrůstají samostatně a mají trubkovitý tvar. Plody jsou kulovité, světlemodré o průměru 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. latiuscula - hustě větvené; křídlaté řapíky délky 1 - 4mm, čepel podlouhlá s tupým koncem, délka 0,5 - 1cm, šířka 2 - 6mm (ve stínu větší)

- var. martinii - kompaktní, hustě olistěné, větve dlouze přitiskle ochlupené; čepel délky 1,5 - 2cm a šířky 3 - 4mm

- var. *propinqua* - rozkladité keře

Coprosma pseudociliata

synonyma: *C. parviflora* var. *pilosa*

Coprosma pseudocuneata

synonyma: *C. cuneata*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě široce rostoucího keře. Dorůstá výšky 0,5 (i 3)m. Větve mohou být mírně ochlupené, průřezu trochu čtvercového. Listy jsou kožovité, tmavězelené se světlejší spodní stranou, tvaru podlouhlého až úzce obvejčitého s tupým nebo špičatým koncem, délky 0,5 - 2cm. Kvete samostatnými květy. Samčí nemají kalich, koruna je zvonkovitá, samičí mají korunu trubkovitou. Plody jsou podlouhlé, červené, délky 4 - 6mm.

Coprosma pubens

synonyma: *C. grayana*, *C. serrata*

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma pumila

synonyma: *C. repens*, *C. repens* var. *pumila*

oblasti: Nový Zéland, Tasmánie, Viktorie

Roste ve Viktorii, Tasmánii a na Novém Zélandě. Kmínky jsou plazivé a kořenují. Borka je hnědá až šedá. Palisty jsou trojúhelníkovité. Listy jsou seskupené do svazečků, jsou kožovité, mírně dužnaté, tvaru eliptického až obvejčitéeliptického s tupým nebo špičatým koncem, délky 0,3 - 1cm, šířky 1 - 4mm a mají křídlaté řapíky. Samčí květy vyrůstají samostatně, koruna je úzce nálevkovitá. Samičí jsou trubkovité. Plody jsou kulovité, červené o průměru 0,6 - 1cm.

Coprosma putida

oblasti: JV Austrálie

Roste na Ostrově Lorda Howa.

Coprosma pyrifolia

synonyma: *Psychotria pyrifolia*, *Uragoga pyrifolia*

Coprosma quadrifida

synonyma: *Canthium billardierei*, *Canthium quadrifidum*, *C. billardierei*, *C. microphylla*, *Marquisia billardierei*

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Novém Jižním Walesu, Viktorii a Tasmánii.

Coprosma raiateensis

synonyma: *C. tahitensis* var. *raiateensis*

Coprosma rapensis

Coprosma repens

synonyma: *C. baueri*, *C. baueriana*, *C. retusa*, *C. stockii*

oblasti: Kalifornie, Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě hustého keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky 1 - 1,8m. Borka je hnědá. Listy jsou široce vejčité, obvejčité nebo i úzce podlouhlé se zúženou bází, podvinuté, lesklé, zelené, dlouhé 2,5 - 8cm a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,6cm. Kvete ve svazčcích. Samčí mají nálevkovitý tvar, samičí téměř nálevkovitý. Plody jsou smáčkly obvejčité, oranžovočervené barvy, průměru 1cm a délky 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Argentea' - listy stříbrobíle skvrnité
- 'Brownie' - vrchní strana listů bronzová, spodní citrónová
- 'Coffee Cream' - béžovožluté okraje listů
- 'Coppershine' - listy s bronzovoměděným tečkováním
- 'Exotica' - béžové až zaltožluté listy s tmavězelenými okraji
- 'Goldsplash'/'Gold Splash' - liste z větší části žluté, střední žebro zlaté
- 'Marble Chips' - listy s bílými okraji
- 'Marble King' - listy tmavězelené se žlutými skvrnami
- 'Marble Queen' - listy kulaté s béžovým okrajem
- 'Marginata' - listy tmavězelené se žlutobílým okrajem
- 'Painter's Palette' - listy lesklé, tmavězelené s nepravidelným zlatožlutým okrajem
- 'Picturata' - listy tmavězelené se žlutým středem
- 'Pink Splendour' - listy s růžovými až žlutobéžovými okraji
- 'Rainbow Surprise' - nízký; růžovo až žlutozelené lístky
- 'Silver Queen' - podobá se *Variegata*, ale klenutější větve
- 'Taupata Gold' - listy béžové se zeleným středem
- 'Variegata' - listy s béžovobílými okraji
- 'Yvpmme' - kompaktní; listy tmavězelené

Coprosma reticulata

Coprosma rhamnoides

synonyma: *C. concinna*, *C. divaricata*, *C. heterophylla*, *C. orbiculata*

oblasti: Nový Zéland

Roste v podobě keře na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Borka je hnědočervená. Listy jsou kulaté, široce vejčité až podlouhlé se zaoblenou špičkou a zúženou bází. Povrch je kožovitý, řídce ochlupený, délka dosahuje 0,6 - 1,2cm a řapíky je dlouhý 1 - 3mm. Samčí

květy vyrůstají po 1 - 4ks s nálevkovitou korunou, samičí jsou samostatné trubkovité. Plody mají tmavěčervené až černé, smáčkle kulovité o průměru 3 - 4mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Tuffet' - husté rozkladité spletené větve; lesklé černé plody

Coprosma rynchocarpa

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma rigida

synonyma: *C. aurantiaca*, *C. lentissima*, *C. turbinata*

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Roste v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky až 2 - 4 (i 5)m. Větve jsou rozkladité. Borka je hnědočervená. Palisty jsou trojúhelníkovité. Listy mají 2 - 3mm řapíky, kožovitou čepel obvejčitého až podlouhlého tvaru s klínovitou bází, délkou 1 - 2cm a šířkou 3 - 9mm. Kvete samostatnými květy. Samičí jsou široce zvonkovité, samičí trubkovité. Plody jsou žlutooranžové až bílé, podlouhlé až obvejčité, délky 4 - 8mm.

Vyskytuje se v blízkosti vody.

Coprosma robusta

synonyma: *C. coffaeoides*

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland, Tasmánie, Viktorie

Roste ve Viktorii a Tasmánii, ale pochází z Nového Zélandu, kde se nejvíce vyskytuje na jihu Jižního Ostrova. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 5 (i 6)m. Listy jsou tmavě zelené až hnědozelené, dlouhé 0,5 - 1,3cm a široké 3 - 4mm. Řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Centrální žebro je na horní straně vyniklé. Samičí květy jsou seskupené v paždí do mnohokvětých klubíček a mají zvonkovitý tvar. Samičí jsou ve složených svazečcích s nálevkovitým tvarem. Plody mají barvu tmavěoranžovou až žlutou, průměr 8 - 9mm a délku 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Variegata' - uprostřed listu žluté proužky

- 'Williamsii Variegata' - klenuté téměř převislé větve; listy s nepravidelně béžovým okrajem a světlezelenými skvrnami ve středu

Coprosma rotundifolia

synonyma: *C. rufescens*

oblasti: J Nový Zéland

Pochází ze Stewartových Ostrovů při Novém Zélandu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Mladé větve jsou ochlupené. Palisty jsou tupé a ochlupné. Listy jsou zakulacené až vejčité či podlouhlé s tupým nebo špičatým koncem a tupou či srdčitou bází, řapíky jsou ochlupené dlouhé 3 - 8mm a čepel má délku 1 - 2,5cm. Kvete po 2 - 4ks. Samičí jsou nálevkovité až zvonkovité, samičí trubkovité. Plody jsou červené až červenooranžové (i bílé), smáčkly kulovité o průměru 4 - 5mm.

Coprosma rubra

synonyma: *C. divaricata* var. *latifolia*

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Jižním i Severním Ostrově Nového Zélandu v podobě keře. Dorůstá výšky až 4m. Borka má červenohnědou barvu. Mladé větve jsou jemně ochlupené. Palisty jsou drobné, trojúhelníkovité a ochlupené. Řapíky jsou křídlaté, dlouhé 4 - 6mm. Čepel je téměř lysá, široce vejčitá až podlouhlá s tupým koncem a téměř uťatou bází, délky 0,5 - 2,5cm a šířky 0,4 - 1,5cm. Samčí květy jsou seskupené po 1 - 6ks a mají nálevkovitý tvar. Samičí jsou ve skupinkách 1 - 3ks a tvar mají trubkovitý. Plody jsou žlutobílé, obvejčité, dlouhé 4 - 6mm.

Coprosma rugosa

synonyma: *C. antipoda*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře v subalpínské zóně. Dorůstá výšky až 4m. Borka je tmavá červenohnědá až šedá. Mladé větve jsou ochlupené, čtvercového průřezu. Listy vyrůstají samostatně nebo ve svazečcích, mají čárkovitý až úzce klinovitý tvar se špičkou, kožovitý tmavězelený povrch se světlejší spodní stranou a délkou 0,6 - 1,8cm. Samčí květy mají rozeklanou korunu až k bázi, samičí vyrůstají samostatně s trubkovitou korunou. Plodeyem je modrá nebo oranžová až průsvitná peckovice podlouhle kulovitá, délky 5 - 8mm.

Coprosma savaiiensis

Coprosma serrulata

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Borka je světlá, papírová. Palisty jsou široce trojúhelníkovité. Listy mají 1 - 1,5cm křídlaté řapíky, čepel je kožovitá, ztustlá, tmavězelená, okrouhlá až široce obvejčitá s vroubkovaným okrajem, délkou 2 - 7cm a šířkou 1,5 - 4cm. Samčí květy vyrůstají při sobě v několika ks a mají zvonkovitý tvar, samičí jsou trubkovité. Plody mají podlouhlý tvar délky 6 - 8mm a červenou nebo červenooranžovou barvu.

Coprosma setosa

Coprosma spathulata

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Větve jsou řídce ochlupené. Palisty jsou úzce trojúhelníkovité. Listy mají 0,7 - 1,5cm řapíky, tlustou kožovitou lesklou čepel okrouhlého až podlouhlého tvaru s tupým, uťatým nebo až vykrojeným koncem, délkou i šířkou 1 - 4cm. Kvete po 1 - 2ks, samčí i samičí jsou trubkovité. Plody jsou kulovité až podlouhlé délky 6 - 8mm a barvy červené až černé.

Coprosma strigulosa

Coprosma sundana

Coprosma tahitensis

synonyma: *C. nadeaudiana*, *C. orohenensis*, *C. tahitensis* var. *oliveri*

oblasti: Tichý oceán

Coprosma talbrockiei

Coprosma tayloriae

Coprosma tenuicaulis

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Mladé větve jsou řídce ochlupené. Palisty jsou drobné, trojúhelníkovité. Listy mají křídlaté řapíky délky 3 - 5mm, čepel je kožovitá, zakulacená až vejčitá či lopatkovitá, dlouhá 0,6 - 2cm a široká 0,7 - 1cm. Samčí květy jsou seskupené do svazečků po 3 - 6ks a mají nálevkovitý tvar. Samičí jsou ve skupinách 1 - 4ks v tvaru opět nálevkovitém. Plody mají černočervenou barvu, kulovitý tvar a průměr 3 - 4mm.

Vyhovují mu vlhké půdy.

Coprosma tenuifolia

oblasti: Nový Zéland

Roste v podobě keře nebo malého stromu na Novém Zélandě. Dorůstá výšky až 5m. Větve jsou řídké a rozložitě. Palisty mají široce podlouhlý tvar. Listy mají řapíky délky 1 - 2,5cm, povrch blanitý až tence kožovitý, tvar vejčitý až podlouhlý s mírně zvlněným okrajem, délku 4 - 10cm a šířku 2 - 4,5cm. Samčí květy jsou seskupené po 2 - 3ks, mají téměř zvonkovitý tvar, samičí jsou trubkovité. Plody mají oranžovou barvu, vejčitý tvar a délku 7 - 8mm.

Coprosma ternata

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma velutina

Coprosma virescens

synonyma: *C. divaricata* var. *pallida*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky 3 (i 5)m. Borka je šedá. Mladé větve mohou být řídce ochlupené. Listy mají 2 - 6mm řapíky, kožovitou čepel okrouhlého nebo vejčitého či lopatkovitého tvaru s tupou špičkou, délkou 4 - 9mm a šířkou 3 - 6mm. Samčí květy vyrůstají samostatně nebo v párech, mají nálevkovitý tvar, samičí jsou pouze samostatné a jejich tvar je trubkovitý. Plody jsou průsvitné, žlutobílé, podlouhlého tvaru délky 5 - 6mm.

Coprosma waima

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m.

Coprosma waimeae

oblasti: Havajské ostrovy, Nový Zéland

Coprosma wallii

oblasti: Nový Zéland

Roste v podobě keře na Novém Zélandě. Dorůstá výšky 2 (i 3)m. Větve mají mírně čtvercový průřez a jsou hrubě ochlupené. Palisty mají trojúhelníkový zašpičatělý tvar. Listy mají řapíky délky pouze 1mm, čepel je kožovitá, široce vejčitá až zakulacená či podlouhlá, délky 5 - 9mm a šířky 5 - 7mm. Kvete ve skupinách 1 - 3ks, samičí jsou krátce zvonkovité, samičí nálevkovité. Plodem je tmavěčervená peckovice délky 3mm a průměru 4,5mm.

Coprosma wollastonii

Coprosma x buchananii

Coprosma x conferta

synonyma: *C. x cunninghamii*, *C. x prorobusta*

Coprosma x gracilicaulis

Coprosma x gracilis

synonyma: C. x viridis

Coprosma x kirkii

synonyma: C. baueri var. oblongifolia

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě poléhavého nebo i vzpřímeného keře. Jedná se o křížence C. acerosa x C. repens. Dorůstá výšky 0,4 - 1m a šířky 1 - 1,8m. Větve jsou propletené a husté. Listy mají čárkovitý až kopinatý tvar s tupým nebo špičatým koncem a zúženou bází, povrch je kožovitý a délka do 3cm. Plody jsou bílé, dlouhé 6mm, mohou být červeně skvrnité. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Brunette' - rozkladitý; bronzové lesklé listy; oranžové plody
- 'Green Girl' - světlezelené listy délky 2cm, šířky 8mm; světležluté plody
- 'Kirkii Variegata' - výška do 1m, šířka větší; list podlouhlé až kopinaté, lesklé, šedozelelé s bílými okraji, délka do 3,5cm a šířka 1,5cm
- 'Minogue' - listy zelené; rychlý růst
- 'Prostrata' - nízký široce rozkladitý polštářovitý; listy dlouze kopinaté lesklé zelené délky do 2cm, šířky 5mm
- 'Variegata' - zprvu rozprostřený, později vzpřímený hustě větvený; listy samostatné nebo seskupené, šedozelelé, panašované s bílými okraji; plody drobné, bílé a průsvitné

Coprosma x molokaiensis

oblasti: Havajské ostrovy

Coprosma x neglecta

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Dorůstá výšky 50cm. Listy jsou zakulacené a zelené. Plody mají barvu červenooranžovou.

Coprosma x tadgellii

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1120>

<https://www.rostliny.net/>